МИНЗДРАВ РОССИИ
Р N001049/01- 261018
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
ЦИКЛОФЕРОН®

Регистрационный номер: Р N001049/01 от 14.03.2008

Торговое наименование: ЦИКЛОФЕРОН® (CYCLOFERON®)

Группировочное наименование: меглюмина акридонацетат

Лекарственная форма: линимент

Состав:

Действующее вещество:	
Меглюмина акридонацетат	50,0 мг
в пересчёте на акридонуксусную кислоту,	
полученный по следующей прописи:	
Акридонуксусная кислота	50,0 мг
Меглюмин (N-метилглюкамин)	38,5 мг
Вспомогательные вещества:	
Бензалкония хлорид	0,1 мг
Пропиленгликоль	до 1,0 мл

Описание: прозрачная жидкость жёлтого цвета со слабым специфическим запахом.

Фармакотерапевтическая группа: прочие иммуностимуляторы.

Код АТХ: L03AX

Фармакологические свойства

ЦИКЛОФЕРОН® является низкомолекулярным индуктором интерферона, что определяет широкий спектр его биологической активности (противовирусной, иммуномодулирующей, противовоспалительной).

ЦИКЛОФЕРОН® эффективен в отношении вируса герпеса и других возбудителей. Обладает прямым противовирусным действием, подавляя репродукцию вируса на ранних сроках (1–5-е сутки) инфекционного процесса.

Основной клинический эффект действия линимента ЦИКЛОФЕРОН® связан с индукцией раннего α-интерферона. Препарат нормализует цитокиновый дисбаланс оппозитных форм иммунного ответа. Местное фармакотерапевтическое действие препарата ЦИКЛОФЕРОН® обусловлено стимуляцией локального иммунного ответа в лимфоидной ткани слизистой оболочки.

Эффективность линимента ЦИКЛОФЕРОН® при лечении хронических пародонтитов проявляется в подавлении роста патогенных микроорганизмов и нормализации уровня секреторного иммуноглобулина А в жидкости зубодесневых карманов, что обеспечивает качественную санацию ротовой полости, способствуя уменьшению воспаления и кровоточивости дёсен.

Показания к применению

У взрослых в комплексной терапии:

– герпетической инфекции кожи и слизистых оболочек;

– неспецифических вагинитов и вагинозов;

– хронических пародонтитов.

Противопоказания

Беременность, период грудного вскармливания, возраст до 18 лет, повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Местно.

При герпетической инфекции линимент наносят тонким слоем на поражённый участок 1–2 раза в сутки в течение пяти дней. При генитальном герпесе – интравагинальные инстилляции один раз в сутки по 5 мл в течение 10–15 дней.

При терапии неспецифического вагинита и бактериального вагиноза препарат вводят интравагинально по 5–10 мл 1–2 раза в сутки в течение 10–15 дней. Возможно применение тампонов, пропитанных линиментом.

При хронических формах заболеваний препарат хорошо сочетается с другими лекарственными средствами (вагинальными таблетками, суппозиториями).

Для применения интравагинально: вскрыть тубу, проколоть мембрану при помощи шприца (объём 5 мл) с одноразовой иглой, набрать линимент, снять и выбросить иглу. В положении лёжа ввести наполненный шприц во влагалище и с помощью поршня выдавить линимент.

Для предотвращения свободной эвакуации препарата вход во влагалище тампонируется небольшим стерильным ватным тампоном на 2–3 часа.

В случае необходимости можно повторить курс через 14 дней.

При лечении хронического пародонтита перед применением линимента желательно промыть пародонтальные карманы антисептиком, затем с помощью ватного тампона нанести препарат в объёме 1,5 мл на десну методом аппликации (не втирать). Процедуру проводить 1–2 раза в сутки с интервалом 10–12 часов. Длительность терапии – 12–14 дней. В случае необходимости повторить курс через 14 дней.

Побочное действие

Аллергические реакции. Возможны кратковременное жжение, незначительная локальная гиперемия. Побочные эффекты слабо выражены и не требуют отмены препарата.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, **сообщите об этом врачу.**

Передозировка

Сведения о передозировке препарата отсутствуют.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Линимент ЦИКЛОФЕРОН® совместим со всеми лекарственными препаратами, традиционно применяемыми при лечении указанных заболеваний (химиотерапевтические препараты и др.).

При хронических формах заболеваний препарат хорошо сочетается с другими лекарственными средствами (вагинальными таблетками и суппозиториями).

Усиливает действие антибиотиков, антисептиков и противогрибковых препаратов.

Особые указания

Препарат имеет горький вкус.

Не рекомендуется интенсивно втирать препарат в десну.

Не допускать попадания препарата на слизистую оболочку глаз. В случае попадания промыть глаза водой.

При отсутствии лечебного эффекта необходимо обратиться к врачу.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

ЦИКЛОФЕРОН® не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

Форма выпуска

Линимент 5 %.

По 5 мл в алюминиевых тубах. Тубу вместе с инструкцией по медицинскому применению

помещают в пачку из картона.

Боковые клапаны пачки могут быть заклеены с двух сторон этикетками или термосклеены.

Условия хранения

При температуре от 15 до 25 ºС.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Юридическое лицо, на имя которого выдано регистрационное удостоверение

ООО «Научно-технологическая фармацевтическая фирма «ПОЛИСАН»
(ООО «НТФФ «ПОЛИСАН»). Россия, 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 72, кор. 2, лит. А, тел./факс: (812) 710-82-25.

Претензии потребителей направлять в адрес держателя регистрационного удостоверения.

Производитель

АО «Фармпроект». Россия, 192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 14, лит. А, тел./факс: (812) 331-93-10.

Генеральный директор
ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» А. А. Борисов