ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению

САГЕНИТ®

Регистрационный номер

Торговое название препарата: Сагенит®

Международное непатентованное или группировочное название: Мезодиэтилэтилендибензолсульфонат

Лекарственная форма: таблетки

Описание:

таблетки белого или почти белого цвета, плоскоцилиндрические.

Состав:

Одна таблетка содержит:

активное вещество: сигетин (мезодиэтилэтилендибензолсульфоната дикалия дигидрат) 100 мг;

вспомогательные вещества: крахмал, стеариновая кислота, целлюлоза микрокристаллическая.

Фармакотерапевтическая группа:

Противоклимактерическое средство

Код АТХ: G02CX.

Фармакологические свойства

Участвует в реализации положительной и отрицательной обратной связи в гипотоламо-гипофизарно-яичниковой системе, оказывает стабилизирующее действие на гонадотропную функцию гипофиза и гипоталамический центр, не оказывая эстрогенного действия на органы-мишени; усиливает сокращения матки; повышает плацентарный кровоток; способствует увеличению концентрации в крови бета-липопротеинов, повышению чувствительности тканей к действию инсулина и утилизации глюкозы.

Показания к применению

- Климактерический синдром (проявляющийся "приливами", повышенным потоотделением, нарушениями сна, раздражительностью, депрессией, забывчивостью, дегенеративными изменениями кожи и слизистых оболочек - ломкостью ногтей, истончением кожи, образованием морщин, дистрофией слизистой мочеполовых путей).

Противопоказания

Гиперчувствительность, метроррагия.

Открытое Акционерное Общество * ОГРН 1025203731937 * ИНН 5260000000 * Нижегородский химико-фармацевтический комбинат * ОАО "НИЖФАРМ" * г. Нижний Новгород

Для документов

С осторожностью

Почечная недостаточность, нарушение функции печени, гиперлипопротеинемия.

Беременность и лактация

Во время беременности и лактации не применяется.

Способ применения и дозы

Принимать внутрь, независимо от времени приема пищи, при климактерических расстройствах у женщин по 1 таблетке в сутки. Суточная доза – до 2-х таблеток в день. Курс лечения 30-40 дней.

Побочное действие

В редких случаях возможны тошнота, рвота, головокружение, аллергические реакции (сыпь, отек век); метроррагия, холестатическая желтуха.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Усиливает действие диуретических, антиаритмических, гипотензивных ЛС, антикоагулянтов.
Ослабляет эффекты мужских половых гормонов.
Фолиевая кислота и препараты щитовидной железы повышают эффективность Сагенита®.

Форма выпуска

Сагенит® таблетки 100 мг.
По 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке, одна или три контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по медицинскому применению препарата в картонной пачке.

Условия хранения

Список Б. В сухом и недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С.

Срок годности

2 года. Не применять после истечения срока годности.

Условия отпуска из аптек

По рецепту.

Производитель

ОАО «НИЖФАРМ», Россия

Претензии потребителей отправлять по адресу:

603950, Нижний Новгород

ГСП-459, ул. Салганская, 7

факс (831) 430-72-28

тел (831) 278-80-88

интернет: www.nizhpharm.ru

И. о. Директора ИДКЭЛС А.Н. Васильев

Директор по регистрации И.В. Филатова