МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП-014515/01-181212
СОГЛАСОВАНО

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

ЛОМАГЕРПАН / LOMAHERPAN®

наименование лекарственного препарата

Торговое название препарата:
Ломагерпан / Lomaherpan®

Лекарственная форма:
крем для наружного и местного применения

Состав
(на 5 г крема):
активный компонент: мелиссы листьев экстракт сухой *- 50,0 мг,
вспомогательные компоненты: парафин белый мягкий – 870,0 мг, этиленгликоль – 650,0 мг, цетомакроголь 1000 – 32,5 мг, спирт бензиловый – 50,0 мг, вода очищенная – 3347,5 мг.

* Мелиссы листьев экстракт сухой получен из листьев Мелиссы лекарственной (Melissa officinalis L.), семейство-губоцветные (Lamiaceae) экстракцией водой; соотношение сырья к конечному продукту (экстракту сухому) 65-75 : 1

Описание

Гомогенный крем светло-желтого цвета с ароматическим запахом.

Фармакотерапевтическая группа
Противовирусное средство растительного происхождения.

Код АТХ:
D06BB

Фармакологические свойства
Препарат обладает противовирусной активностью в отношении вируса простого герпеса (Herpes simplex). Механизм действия препарата обусловлен блокированием рецепторов клеточной мембраны и внешней оболочки вируса, что приводит к нарушению способности вируса проникать в клетку. Препарат также проявляет противовоспалительные свойства.

Фармакокинетика

Препарат содержит комплекс биологически активных веществ, в связи с чем, проведение фармакокинетических исследований не представляется возможным.

Показания к применению

Поражения кожи и слизистых оболочек, вызванные вирусом герпеса (Herpes simplex) I и II типов, в том числе локализующихся на губах.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Детский возраст до 18 лет.

Применение в период беременности и грудного вскармливания

В связи с отсутствием достаточного количества клинических данных не рекомендуется применение препарата в период беременности и грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Крем наносится на пораженные участки кожи или слизистых оболочек 2-4 раза в день. Улучшение обычно наблюдается уже в самом начале лечения. Лечение продолжают еще в течение трех дней после полного исчезновения поражений.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции. Если при использовании препарата отмечаются нежелательные явления, сообщите о них своему лечащему врачу.

Передозировка

Случаи передозировки препарата до настоящего времени не зарегистрированы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не описано.

Особые указания

Начинать лечение рекомендуется при первых симптомах или начальных признаках герпесной инфекции (жжение, зуд). Для нанесения крема рекомендуется использовать ватный тампон или ватную палочку.

Влияние препарата на способность к управлению транспортными средствами и работе с механизмами

Препарат не оказывает влияния на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление автомобилем и другими транспортными средствами, работа с движущими механизмами, работа диспетчера и оператора).

Форма выпуска

Крем для наружного и местного применения. По 5 г крема в тубу алюминиевую с внутренним защитным покрытием вместе с инструкцией по применению в пачку картонную.

Срок годности

5 лет.

Не применять препарат по истечении срока годности!

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель

ЛОМАФАРМ Рудольф Ломанн ГмбХ КГ


Лангес Фельд 5, 31860 Эммертал, Германия

Представительство в России / Организация, принимающая претензии потребителей

117513 Москва, ул. Островитянова, д.6

тел.: (495) 225 71 31

Менеджер отдела регистрации ЛС
Доктор Вильмар Швабе ГмбХ &Ко.КГ



М.С. Евстифеева