МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Мелисон

наименование лекарственного препарата

Лекарственная форма
Настойка

Состав:
Для приготовления 1 л настойки необходимо:

Мелиссы травы измельченной- 200 г
Вспомогательные вещества:
Этилового спирта 40 % (этанола)- достаточное количество до получения 1 л настойки

Описание
Прозрачная жидкость от желтого цвета с коричневым оттенком до коричневого цвета с красным оттенком. При хранении возможно выпадение осадка.

Фармакотерапевтическая группа
Седативное средство растительного происхождения

Фармакологические свойства
Оказывает мягкое успокаивающее действие.

Показания к применению
Повышенная нервная возбудимость, неврозы, неврозоподобные состояния.

Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, артериальная гипотензия, сонливость, вялость, заторможенность, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 18 лет.

С осторожностью
Заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга.

Применение при беременности и лактации
Противопоказан.

Способ применения и дозы
Внутрь по 15-20 капель 3 раза в день. Длительность лечения - 2 – 3 недели. Возможно проведение повторного курса лечения после согласования с врачом.

Побочное действие
Возможны аллергические реакции.

Взаимодействие с лекарственными средствами
Возможно усиление действия снотворных средств и других лекарственных препаратов, угнетающих центральную нервную систему.

Особые указания
В случае индивидуальной непереносимости Мелисона, его заменяют препаратами валерианы.
При длительном применении в больших дозах возможно снижение психомоторных реакций, что следует учитывать при вождении транспорта, работе с механизмами и т.п.
Препарат содержит этиловый спирт 40 % (этанол). Максимальная разовая доза и максимальная суточная доза содержат соответственно 0,5 г и 1,5 г абсолютного спирта этилового (1 капля препарата – 0,02 г абсолютного спирта этилового)

Передозировка
В настоящее время передозировок препарата не выявлено.

Форма выпуска
Настойка. По 50 мл во флакон оранжевого стекла. По 100 мл во флакон оранжевого стекла. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. Для стационаров: по 4,5 кг, 9 кг, 18 кг в канистру из полимерных материалов.

Условия хранения
В защищенном от света месте при температуре от 12 до 15 ^{0}С.
Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности
3 года
Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек
Без рецепта.

Производитель:
ООО «Росбио»
192019, г. Санкт-Петербург, ул. Мельничная, 12. Лит. «А».
Тел./факс: (812) 412-12-71
301150, Тульская обл., село Воскресенское, ул. Заводская, д. 1-а

Организация, принимающая претензии:
ООО «Росбио», 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Мельничная, 12. Лит. «А».
Тел./факс: (812) 412-12-71

Представители фирмы:
Исполнительный директор
ООО «Росбио» А.М. Фахрутдинов

Общество с ограниченной ответственностью "РОСБИО" "ROSBIO" Company * Санкт-Петербург *