МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛС-002177- 090713
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Би-ксикам
таблетки 7,5 мг и 15 мг
ОАО «ВЕРОФАРМ», Россия

Изменение № 1

Дата внесения изменения «_____» 09 07 13 _____ 20____ г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав: *Активное вещество:* мелоксикам в пересчете на 100 % вещество 7,5 мг 15 мг. *Вспомогательные вещества:* Натрия цитрат дигидрат 1,8 мг 3,6 мг Лактоза безводная (сахар молочный) 25,423 мг 50,846 мг Целлюлоза микрокристаллическая 29,523 мг 59,046 мг Повидон (коллидон, поливинилпирролидон 25000) 1,8 мг 3,6 мг Кремния диоксид коллоидный (аэросил) 0,9 мг 1,8 мг Кросповидон (полипласдон ИКС ЭЛ – 10) 22,155 мг 44,31 мг Магния стеарат 0,9 мг 1,8 мг **Форма выпуска** Таблетки 7,5 мг и 15 мг По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку. По 20 таблеток в банку светозащитного стекла. По 20 таблеток в банку или флакон из полимерных материалов. Каждую банку или флакон или 1 контурную ячейковую упаковку для таблеток 15 мг или 2 контурных ячейковых упаковки для таблеток 7,5 мг или 15 мг вместе с инструкцией по применению в пачку из картона.	**Состав:** *Активное вещество:* мелоксикам в пересчете на 100 % вещество 7,5 мг 15 мг. *Вспомогательные вещества:* Натрия цитрата дигидрат 1,8 мг 3,6 мг Лактопресс (Лактоза безводная) 25,423 мг 50,846 мг Целлюлоза микрокристаллическая 29,523 мг 59,046 мг Повидон (коллидон, поливинилпирролидон 25000) 1,8 мг 3,6 мг Кремния диоксид коллоидный (аэросил) 0,9 мг 1,8 мг Кросповидон (полипласдон ИКС ЭЛ – 10) 22,155 мг 44,31 мг Магния стеарат 0,9 мг 1,8 мг **Форма выпуска** Таблетки 7,5 мг и 15 мг По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку. По 20 таблеток в банку из полимерных материалов. Каждую банку или 1 контурную ячейковую упаковку для таблеток по 15 мг, или 2 контурные ячейковые упаковки для таблеток по 7.5 мг или 15 мг вместе с инструкцией по применению в пачку из картона.

Условия хранения Список Б. В сухом, защищенном от света месте, недоступном детям, при температуре не выше 25°С. **Срок годности** 2 года. Не использовать по истечении срока годности.	**Условия хранения** При температуре не выше 25°С. Хранить в недоступном для детей месте. **Срок годности** 5 лет. Не применять по истечении срока годности.

Начальник
Медицинского управления Е.В. Кривошеева