МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛС-002177- 310314
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Би-ксикам
таблетки 7,5 мг и 15 мг
ОАО «ВЕРОФАРМ», Россия

Изменение № 2

Дата внесения изменения «_____» 310314 20____ г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав: *Активное вещество:* мелоксикам в пересчете на 100 % вещество 7,5 мг 15 мг. *Вспомогательные вещества:* Натрия цитрата дигидрат 1,8 мг 3,6 мг Лактопресс (Лактоза безводная) 25,423 мг 50,846 мг Целлюлоза микрокристаллическая 29,523 мг 59,046 мг Повидон (коллидон, поливинилпирролидон 25000) 1,8 мг 3,6 мг Кремния диоксид коллоидный (аэросил) 0,9 мг 1,8 мг Кросповидон (полипласдон ИКС ЭЛ – 10) 22,155 мг 44,31 мг Магния стеарат 0,9 мг 1,8 мг	**Состав:** *Активное вещество:* мелоксикам в пересчете на 100 % вещество 7,5 мг 15 мг. *Вспомогательные вещества:* Натрия цитрата дигидрат 1,8 мг 3,6 мг Лактопресс (лактоза безводная) 25,423 мг 50,846 мг Целлюлоза микрокристаллическая 29,523 мг 59,046 мг Повидон (коллидон, поливинилпирролидон 25000) 1,8 мг 3,6 мг Кремния диоксид коллоидный (аэросил) 0,9 мг 1,8 мг Кросповидон (полипласдон ИКС ЭЛ – 10) 22,155 мг 44,31 мг Магния стеарат 0,9 мг 1,8 мг *Масса таблетки:* *90 мг 180 мг*

Старая редакция	Новая редакция
Противопоказания - гиперчувствительность к какому-либо компоненту препарата; -аспириновая бронхиальная астма; - обострение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки; - желудочно-кишечное, цереброваскулярное кровотечение или иное кровотечение; - тяжелая почечная недостаточность (если не проводится гемодиализ); - тяжелая печеночная недостаточность; - тяжелая сердечная недостаточность; - дети в возрасте до 15 лет; - беременность; -период лактации. ***С осторожностью:*** препарат следует применять с осторожностью у пациентов пожилого возраста, эрозивно-язвенным поражением желудочно-кишечного тракта в анамнезе.	**Противопоказания** - гиперчувствительность к какому-либо компоненту препарата; - аспириновая бронхиальная астма; - дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция; - обострение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки; - желудочно-кишечное, цереброваскулярное кровотечение или иное кровотечение; - тяжелая почечная недостаточность (если не проводится гемодиализ); - тяжелая печеночная недостаточность; - тяжелая сердечная недостаточность; - дети в возрасте до 15 лет; - беременность; - период лактации. ***С осторожностью:*** препарат следует применять с осторожностью у пациентов пожилого возраста, у пациентов с эрозивно-язвенным поражением желудочно-кишечного тракта в анамнезе.

Начальник
Медицинского управления

Открытое Акционерное Общество "ВЕРОФАРМ" "VEROPHARM" ОАО Дирекция по развитию ОГРН 1027739148820 МОСКВА

Г.А. Кузнецова