

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

МЕРОПЕНАБОЛ®

Регистрационный номер: ЛСР-002218/07

Изменение № 2

Срок введения Изменения с «18» 03 2008 г.

Старая редакция	Новая редакция
Побочное действие. Со стороны пищеварительной системы: боли в эпигастральной области, тошнота, рвота, диарея, холестатический гепатит, гипербилирубинемия, повышение активности "печеночных" трансаминаз и ЩФ, ЛДГ, редко – кандидоз полости рта, псевдомембранозный энтероколит. Со стороны сердечно-сосудистой системы: развитие или усугубление сердечной недостаточности, остановка сердца, тахи- или брадикардия, снижение или повышение артериального давления, обморочные состояния, инфаркт миокарда, тромбоэмболия ветвей легочной артерии. Со стороны мочевыделительной системы: дизурия, отеки, нарушение функции почек (гиперкреатининемия, повышение концентрации мочевины в плазме), гематурия. Аллергические реакции: зуд кожи, кожная сыпь, крапивница, мультиформная экссудативная эритема, ангионевротический отек, анафилактический шок. Со стороны нервной системы: головная боль, парестезии, бессонница, повышенная возбудимость, тревожность, депрессия, нарушение сознания, галлюцинации, эпилептиформные припадки, судороги. Со стороны лабораторных	Побочное действие. Со стороны пищеварительной системы: боли в эпигастральной области, тошнота, рвота, диарея, холестатический гепатит, гипербилирубинемия, повышение активности "печеночных" трансаминаз и щелочной фосфатазы, лактатдегидрогеназы, редко – кандидоз полости рта, псевдомембранозный колит. Со стороны сердечно-сосудистой системы: тахи- или брадикардия, снижение или повышение артериального давления, развитие или усугубление сердечной недостаточности, обморочные состояния, инфаркт миокарда, тромбоэмболия ветвей легочной артерии, остановка сердца. Со стороны мочевыделительной системы: дизурия, отеки, нарушение функции почек (гиперкреатининемия, повышение концентрации мочевины в плазме), гематурия. Аллергические реакции: зуд кожи, кожная сыпь, крапивница, мультиформная экссудативная эритема, ангионевротический отек, анафилактический шок. Со стороны нервной системы: головная боль, парестезии, бессонница, повышенная возбудимость, тревожность, депрессия, нарушение сознания, галлюцинации, эпилептиформные припадки, судороги. Со стороны лабораторных

<i>показателей:</i> эозинофилия, нейтропения, лейкопения, редко – агранулоцитоз, обратимая тромбоцитопения, снижение частичного тромбопластинового времени. <i>Местные реакции:</i> воспаление, тромбофлебит, болезненность в месте введения. <i>Прочие:</i> положительная прямая или непрямая пробы Кумбса, анемия, диспноэ, вагинальный кандидоз. Взаимодействие с другими лекарственными препаратами Несовместим с гепарином. Совместим с 0,9 % раствором натрия хлорида, 5 % или 10 % раствором декстрозы, с 0,02 % раствором натрия гидрокарбоната, 5 % раствором декстрозы с 0,225 % натрия хлоридом, 5 % раствором декстрозы с 0,15 % калия хлоридом, 2,5 % и 10 % раствором маннитола. Ганцикловир повышает риск развития генерализованных судорог. Проявляет антагонизм при взаимодействии с бета-лактамами антибиотиками. Лекарственные средства, блокирующие канальцевую секрецию, замедляют выведение и увеличивают концентрацию меропенема в плазме.	<i>показателей:</i> эозинофилия, нейтропения, лейкопения, редко – агранулоцитоз, обратимая тромбоцитопения, снижение частичного тромбопластинового времени. <i>Местные реакции:</i> воспаление, тромбофлебит, болезненность в месте введения. <i>Прочие:</i> положительная прямая или непрямая пробы Кумбса, анемия, диспноэ, вагинальный кандидоз. Взаимодействие с другими лекарственными препаратами Совместим с 0,9 % раствором натрия хлорида, 5 % или 10 % растворами декстрозы, 5 % раствором декстрозы и 0,02 % раствором натрия гидрокарбоната, 0,9 % раствором натрия хлорида и 5% раствором декстрозы, 5 % раствором декстрозы с 0,225 % натрия хлоридом, 5 % раствором декстрозы с 0,15 % калия хлоридом, 2,5 % и 10 % раствором маннитола. Совместимость меропенема с другими лекарственными препаратами, кроме перечисленных выше, не установлена. Поэтому меропенем и его растворы не следует смешивать или добавлять в растворы, содержащие другие лекарственные препараты. Лекарственные средства, блокирующие канальцевую секрецию, замедляют выведение и увеличивают концентрацию меропенема в плазме.
Срок годности. 2 года. Не использовать позже указанного срока годности на упаковке.	Срок годности. 3 года. Не использовать позже указанного срока годности на упаковке.

Генеральный директор
 ООО «АБОЛмед»

О.М. Касьян