ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению

ПРЕПАРАТА
Сайропем

Регистрационный номер: ЛСР-004345/09

Изменение № 1

Срок введения изменений с "28" сентября 2010 г.

Старая редакция	Новая редакция
Взаимодействие с другими лекарственными препаратами: Меропенем фармацевтически несовместим с гепарином. Ганцикловир повышает риск развития генерализованных судорог. Меропенем проявляет антагонизм при взаимодействии с бета-лактамными антибиотиками. Лекарственные препараты, блокирующие канальцевую секрецию, замедляют выведение и увеличивают концентрацию меропенема в плазме. Совместное назначение меропенема с потенциально нефротоксичными препаратами повышает риск развития нефротоксических реакций. Возможное влияние меропенема на связь с белками плазмы крови других лекарственных препаратов не изучалось, однако учитывая его слабый аффинитет (см. кинетику) к белкам плазмы крови, взаимодействие с другими препаратами на этом уровне маловероятно. Меропенем может снижать концентрацию вальпроевой кислоты в сыворотке крови до субтерапевтической, что может потребовать коррекции ее дозы.	**Взаимодействие с другими лекарственными препаратами:** Лекарственные препараты, блокирующие канальцевую секрецию, замедляют выведение и увеличивают концентрацию меропенема в плазме. Совместное назначение меропенема с потенциально нефротоксичными препаратами повышает риск развития нефротоксических реакций. Возможное влияние меропенема на связь с белками плазмы крови других лекарственных препаратов не изучалось, однако, оно представляется маловероятным, учитывая слабый аффинитет меропенема к белкам плазмы крови (см. раздел «Фармакокинетика»). Меропенем может снижать концентрацию вальпроевой кислоты в плазме крови до субтерапевтической.

Директор ЗАО «Корал-Мед» Арора Раджеш

SIMPEX PHARMA PVT. LTD. INDIA NEW DELHI

РОСЗДРАВНАДЗОРА
ЭЛЕКТРОННЫЙ ОТЧЕТ
ДЛЯ ДАННОЙ
ДОКУМЕНТА
10004

62389