МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛСР-004345/09-311019
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НЦЭСМП
МЗ РФ
ЭКСПЕРТНЫЙ ОТЧЕТ
ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДЛЯ ДАННОЙ
ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА
0000000003
ФЛЕУ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Сайронем

Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения, 0,5 г, 1,0 г

Симпекс Фарма Пвт. Лтд., Индия

Изменение № 5

Дата внесения Изменения «____» 311019 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ Повышенная чувствительность к меропенему, другим компонентам препарата и другим карбапенемам, выраженная повышенная чувствительность (анафилактические реакции, тяжелые кожные реакции) к другим бета-лактамным антибиотикам (т.е. пенициллинам или цефалоспоринам); детский возраст (до 3 месяцев).	**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ** Гиперчувствительность к меропенему, к вспомогательным веществам или другим препаратам группы карбапенемов в анамнезе. Выраженная гиперчувствительность (анафилактические реакции, тяжелые кожные реакции) к любому антибактериальному средству, имеющему бета-лактамную структуру (т.е. пенициллинам или цефалоспоринам). Детский возраст до 3-х месяцев».

Представитель фирмы Джумаева Т.И.

SIMS ★ New Delhi ★ INDIA

122489