ЛП-№(012479)-(РГ-RU) от 18.11.2025

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 12.11.2025 № 28227
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Ингалипт

Регистрационный номер

Торговое наименование

Ингалипт

Международное непатентованное или группировочное наименование

Месульфамид + Мяты перечной листьев масло + Сульфатиазид + Тимол + Эвкалипта шарикового листьев масло

Лекарственная форма

Аэрозоль для местного применения

Состав:

1 баллон 15 или 30 мл содержит

Действующие вещества:

Месульфамид натрия (стрептоцид растворимый)	0,375 г	0,750 г
Сульфатиазол натрия	0,375 г	0,750 г
Тимол	0,0075 г	0,015 г
Эвкалипта шарикового листьев масло	0,0075 г	0,015 г
Мяты перечной листьев масло	0,0075 г	0,015 г

Вспомогательные вещества: этанол 95% (спирт этиловый), сахароза (сахар), глицерол (глицерин), полисорбат-80 (твин-80), вода очищенная, азот.

Описание

Жидкость от светло-желтого до темно-желтого цвета, находящаяся в бал-

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 12.11.2025 № 28227
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

лоне с клапаном непрерывного действия под давлением сжатого газа. Препарат при выходе из баллона образует струю с характерным запахом тимола и ментола.

Фармакотерапевтическая группа

Препараты для лечения заболеваний горла; антисептики.

Код АТХ: R02AA20

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Входящие в состав препарата растворимые сульфаниламиды оказывают противомикробное действие (в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, вызывающих заболевания полости рта и глотки).

Тимол, эвкалиптовое масло и мяты перечной масло оказывают противогрибковый (в отношении грибов рода Candida), противомикробный, противовоспалительный и легкий обезболивающий эффект.

Фармакокинетика

Препарат образует терапевтическую концентрацию, главным образом, в очаге воспаления. Частично всасываются сульфаниламидные препараты, которые связываются с белками крови: стрептоцид растворимый на 12–14 %, сульфатиазол натрия на 55 %. В процессе биотрансформации образуются ацетилированные формы препаратов, в виде которых они выводятся почками. Период полувыведения стрептоцида составляет 10 час, сульфатиазола натрия – 1–2 час.

Показания к применению

Тонзиллит, фарингит, ларингит, афтозный и язвенный стоматит.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата, детский возраст (до 3 лет), беременность, период грудного вскармливания, дефицит сахаразы/ изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 12.11.2025 № 28227
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Противопоказано применение препарата Ингалипт при беременности и в период грудного вскармливания. В состав препарата входят сульфаниламиды, которые проникают через плаценту и обнаруживаются в крови плода. Возможно развитие тератогенного действия. При необходимости использования препарата в период грудного вскармливания необходимо прекратить грудное вскармливание, так как сульфаниламиды проникают в грудное молоко и могут вызывать ядерную желтуху у новорожденных.

Способ применения и дозы

Местно. Сняв предохранительный колпачок с баллона и надев прилагаемый распылитель, распыляют взвесь в полость рта в течение 1–2 секунд. Препарат удерживают в полости рта 5–7 минут. Орошение производят 3–4 раза в сутки с предварительным прополаскиванием полости рта кипяченой водой.

Во избежание снижения эффективности препарата рекомендуется воздерживаться от приема пищи и жидкости в течение 30 мин после орошения.

Курс лечения не более 7 дней.

Во избежание закупорки отверстия распылителя по окончании манипуляции его необходимо продуть или поместить в стакан с чистой водой.

При использовании баллон следует держать строго вертикально.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции (высыпания на коже, зуд), кратковременное ощущение жжения или першения в горле. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Симптомы: тошнота, рвота, связанные с заглатыванием части препарата.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 12.11.2025 № 28227
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Лечение: специфический антидот отсутствует, проводится симптоматическая и поддерживающая терапия.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Возможно одновременное применение с другими местными противомикробными средствами с целью расширения спектра действия и повышения эффективности.

Особые указания

Применение препарата Ингалипт у детей возможно только по рекомендации врача.

Баллон не вскрывать и не нагревать. Предохранять от падений, ударов, воздействия прямых солнечных лучей.

При применении препарата в течение более 2 недель возможно поражение зубов.

Препарат содержит этанол 95 % (0,9 г/15 мл и 1,8 г/30 мл); содержание абсолютного этилового спирта в разовой дозе составляет до 10 мг, в максимальной суточной дозе – до 40 мг.

Препарат содержит сахарозу (0,75 г/15 мл и 1,5 г/30 мл), что следует учитывать пациентам с сахарным диабетом.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Аэрозоль для местного применения.

По 15 или по 30 мл в баллоны аэрозольные алюминиевые моноблочные с клапанами непрерывного действия и предохранительными колпачками. На баллон наносят текст или наклеивают этикетку самоклеящуюся. Каждый баллон вместе с распылителем и инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 12.11.2025 № 28227
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Условия хранения

При температуре не выше 25 ºС. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения

ООО «Формула-ФР», Россия.

109443, Москва г., Волгоградский пр-кт, д. 139, офис 10

Производитель/ Организация, принимающая претензии потребителей

АО «Биннофарм», Россия.

г. Москва, г. Зеленоград, ул. Конструктора Гуськова, д. 3, стр. 1.

Телефон: +7 (495) 646-28-68

e-mail: info@binnopharmgroup.ru