ЛП-№(012373)-(РГ-RU) от 07.11.2025

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 05.11.2025 № 27562
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ИНГАЛИПТ

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Ингалипт

Международное непатентованное или группировочное наименование: месульфамид + мяты перечной листьев масло + сульфатиазол + тимол + эвкалипта шарикового листьев масло

Лекарственная форма: аэрозоль для местного применения

Состав:

1 баллон содержит:	15 мл	20 мл	30 мл	45 мл	50 мл
Действующие вещества:					
Месульфамид (Сульфаниламид натрия, стрептоцид растворимый)	0,375 г	0,500 г	0,750 г	1,125 г	1,250 г
Сульфатиазола натрия пентагидрат	0,375 г	0,500 г	0,750 г	1,125 г	1,250 г
(в пересчете на сульфатиазол натрия безводный)	0,281 г	0,375 г	0,563 г	0,844 г	0,938 г
Тимол	0,0075 г	0,01 г	0,015 г	0,0225 г	0,025 г
Эвкалипта шарикового листьев масло	0,0075 г	0,01 г	0,015 г	0,0225 г	0,025 г
Мяты перечной листьев масло	0,0075 г	0,01 г	0,015 г	0,0225 г	0,025 г
Вспомогательные вещества:					
Этанол (спирт этиловый) 95 %	0,9 г	1,2 г	1,8 г	2,7 г	3,0 г
Сахаринат натрия	0,0225 г	0,03 г	0,045 г	0,0675 г	0,075 г
Глицерол (глицерин)	1,05 г	1,40 г	2,10 г	3,15 г	3,50 г
Полисорбат-80 (твин-80)	0,45 г	0,60 г	0,90 г	1,35 г	1,50 г
Вода очищенная	до 15 мл	до 20 мл	до 30 мл	до 45 мл	до 50 мл
Азот	0,15 - 0,2 г	0,20 - 0,27 г	0,3 - 0,4 г	0,45 - 0,6 г	0,5 -0,67 г

Описание: жидкость от светло-желтого до темно-желтого цвета с характерным запахом.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 05.11.2025 № 27562
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Фармакотерапевтическая группа: препараты для лечения заболеваний горла; антисептики

Код АТХ: R02AA20

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Комбинированный препарат для местного применения. Входящие в состав препарата растворимые сульфаниламиды оказывают противомикробное действие (в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, вызывающих заболевания полости рта и глотки). Тимол, эвкалипта шарикового листьев масло и мяты перечной листьев масло оказывают противогрибковый (в отношении грибов рода *Candida*), противомикробный, противовоспалительный и легкий обезболивающий эффект.

Фармакокинетика

Абсорбция

Препарат образует терапевтическую концентрацию, главным образом, в очаге воспаления. Частично всасываются сульфаниламидные препараты, которые связываются с белками крови: стрептоцид растворимый на 12-14 %, сульфатиазол натрия на 55 %.

Биотрансформация

В процессе биотрансформации образуются ацетилированные формы препаратов, в виде которых они выводятся почками.

Элиминация

Период полувыведения стрептоцида составляет 10 ч, сульфатиазола натрия – 1-2 ч.

Показания к применению

Тонзиллит, фарингит, ларингит, афтозный и язвенный стоматит.

Противопоказания

- Гиперчувствительность к любому из компонентов препарата.
- Беременность.
- Период грудного вскармливания.
- Детский возраст (до 3 лет).
- Дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 05.11.2025 № 27562
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Беременность

Противопоказано применение препарата Ингалипт при беременности. В состав препарата входят сульфаниламиды, которые проникают через плаценту и обнаруживаются в крови плода. Возможно развитие тератогенного действия.

Период грудного вскармливания

Противопоказано применение препарата Ингалипт в период грудного вскармливания.

При необходимости использования препарата в период грудного вскармливания необходимо прекратить грудное вскармливание, так как сульфаниламиды проникают в грудное молоко и могут вызвать ядерную желтуху у новорожденных.

Способ применения и дозы

Местно. Сняв предохранительный колпачок с баллона и надев прилагаемый распылитель, распыляют взвесь в полость рта в течение 1-2 секунды. Препарат удерживают в полости рта 5-7 минут. Орошение проводится 3-4 раза в сутки с предварительным прополаскиванием рта кипяченой водой.

Если после лечения улучшения не наступает или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Применяйте препарат только согласно тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

В случае необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата.

Во избежание снижения эффективности препарата рекомендуется воздерживаться от приема пищи и жидкости в течение 30 мин после орошения.

Курс лечения не более 7 дней.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции (высыпания на коже, зуд), кратковременное ощущение жжения или першения в горле.

При проявлении нежелательных реакций необходимо отменить применение препарата и обратиться к врачу.

Если у Вас отмечаются нежелательные реакции, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие нежелательные реакции, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 05.11.2025 № 27562
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Передозировка

Симптомы

Тошнота, рвота, связанные с заглатыванием части препарата.

Лечение

Специфический антидот отсутствует, симптоматическая и поддерживающая терапия.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Совместим с другими лекарственными средствами, данные о клинически значимых взаимодействиях отсутствуют.

Возможно одновременное применение с другими местными противомикробными средствами с целью расширения спектра действия и повышения эффективности.

Особые указания

Применение препарата Ингалипт у детей возможно только по решению врача.

Баллон не вскрывать и не нагревать. Предохранять от падений, ударов, воздействия прямых солнечных лучей.

Вспомогательные вещества

Этанол

Данный лекарственный препарат содержит этанол (спирт этиловый) 95 % (0,9 г/15 мл, 1,2 г/20 мл, 1,8 г/30 мл, 2,7 г/45 мл, 3,0 г/50 мл). Количество этанола в дозе данного лекарственного препарата эквивалентно не более чем 1,95 мл пива или 0,78 мл вина. Небольшое количество спирта в данном лекарственном препарате не будет оказывать заметного действия.

Сахароза

Данный лекарственный препарат содержит сахарозу. Пациентам с редко встречающейся наследственной непереносимостью фруктозы, глюкозо-галактозной мальабсорбцией или дефицитом сахаразы/изомальтазы не следует принимать данный лекарственный препарат.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Ингалипт не оказывает влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

Форма выпуска

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 05.11.2025 № 27562
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Аэрозоль для местного применения.

По 15, 20, 30, 45, 50 мл в баллоне аэрозольном из алюминия, с клапаном непрерывного действия, с колпачком и распылительной насадкой.

Баллон маркируют методом печати краской или наклеивают этикетку.

Каждый баллон с распылителем и инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

При температуре не выше 30 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения

АО «Кировская фармацевтическая фабрика»

Россия, 610000, Кировская обл., г. Киров, ул. Московская, д. 27 а

Производитель

АО «Кировская фармацевтическая фабрика»

Россия, 610000, Кировская обл., г. Киров, ул. Московская, д. 27 а

Организация, принимающая претензии потребителей

АО «Кировская фармацевтическая фабрика»

Россия, 610000, Кировская обл., г. Киров, ул. Московская, д. 27 а

Тел. (8332) 22-01-26

E-mail: kachestvo-s@k-ff.ru