

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
Бом-Бенге мазь

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Бом-Бенге мазь

Международное непатентованное или группировочное наименование:
Метилсалицилат + [Левоментол].

Лекарственная форма: мазь для наружного применения.

Состав на 100 г: *Действующие вещества:* метилсалицилат – 20,2 г; левоментол – 3,9 г;
Вспомогательные вещества: вазелин – 68,9 г; парафин (парафинов нефтяных твердых)
марка П-1 – 7,0 г.

Описание. Мазь от светло-желтого до желтого цвета с запахом левоментола и метилсалицилата.

Фармакотерапевтическая группа: противовоспалительное средство для наружного применения.

Код АТХ: M02AC.

Фармакологические свойства: Оказывает местное противовоспалительное и обезболивающее действие.

Фармакокинетика

При местном применении активные компоненты препарата не абсорбируются в системный кровоток и не оказывают системного действия.

Показания:

Артралгии, миалгии, (мышечные боли) до и после занятий спортом, болевой синдром при заболеваниях околосуставных тканей, люмбаишиалгия, радикулит.

Противопоказания:

Гиперчувствительность, нарушение целостности кожных покровов, воспалительные заболевания кожи в месте предполагаемого нанесения. Беременность III триместр, детский возраст до 18 лет.

С осторожностью.

Непереносимость производных салициловой кислоты. Беременность I-II триместр.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания:

Не применяется в период грудного вскармливания и в III триместре беременности. Применение в I-II триместрах только, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

Способ применения и дозы. Наружно (в виде растираний). Необходимое количество мази (2-4 г, что соответствует объему крупной вишни) втирают в болезненные участки кожи. При необходимости процедуру повторяют через несколько часов (до 3 раз в день). Продолжительность курса (без консультации врача) 10 дней.

Применение препарата при первом приеме или при его отмене: нет сведений.

Передозировка. Передозировка ментола и метилсалицилата наблюдалась в отдельных случаях, главным образом у детей при случайном приеме внутрь препаратов, содержащих данные вещества.

Симптомы передозировки: возбуждение, увеличение глубины дыхания, гиперпирексия, тошнота, боль в животе, рвота и симптомы угнетения центральной нервной системы, такие как головокружение, неустойчивая походка, «приливы» крови к лицу, сонливость, угнетение дыхания и кома.

Лечение симптоматическое и поддерживающее: коррекция водно-электролитного баланса, назначение адсорбирующих средств и солевых слабительных, форсированный диурез, наружное охлаждение тела; в тяжелых случаях – переливание крови, гемодиализ.

Передозировка при местном применении происходит редко и только при неправильном применении препарата (нанесение на слизистые оболочки, на обширные области поврежденной или инфицированной кожи).

Побочное действие. В редких случаях развивается гиперчувствительность к препарату, кожные аллергические реакции (зуд кожи, крапивница, кожная сыпь) а также ангионевротический отек.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами. Препарат вызывает гиперемия кожи и рефлекторно усиливает циркуляцию крови в подкожной ткани, таким образом, совместное применение с другими препаратами местного действия может приводить к усилению их всасывания. Использование больших количеств может повышать токсичность метотрексата и снижать терапевтический эффект гипогликемических средств. Препарат не использовать с пероральными антикоагулянтами.

Особые указания:

Не допускать попадания на конъюнктиву, другие слизистые оболочки. Не наносить на поврежденную или раздраженную кожу. Не применять с согревающими компрессами.

Сведения о возможном влиянии препарата на способность управлять транспортными средствами и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций - нет сведений.

Форма выпуска.

Мазь для наружного применения.

По 20, 25, 30, 40, 50 г в алюминиевые тубы с бушонами или колпачками, или тубы из комбинированного материала с бушонами, или тубы ламинатные с бушонами или колпачками, или импортные.

По 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 г в банки или флаконы темного стекла с навинчиваемыми пластмассовыми крышками с уплотняющим элементом или прокладками или средствами укупорочными полимерными, или в банки стеклянные с треугольным венчиком, укупоренные крышками полиэтиленовыми натягиваемыми, или по 50, 100 г во флаконы полимерные с крышками с поршнем для выдавливания.

Каждую тубу, банку или флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона коробочного для потребительской тары или из картона макулатурного. Допускается укладка туб, банок или флаконов в групповую упаковку (коробку картонную) с равным количеством инструкций по применению.

На тубу, банку или флакон наклеивают этикетки из бумаги этикеточной или писчей или самоклеящуюся этикетку. Допускается нанесение маркировки непосредственно на тубу, банку или флакон.

Срок годности: 3 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия хранения: в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска:

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения:

ООО «Женел РД», Россия, 249717, Калужская обл., Козельский район, с. Фроловское, ул. Православная, д. 70.

Организация, принимающая претензии потребителей:

АО «Самарамедпром», Россия, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 12, помещ. 16Н/38. Тел./факс: (846) 373-81-07, (846) 373-81-08.

Производитель:

АО «Самарамедпром», Россия, Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Ленина, зд. 99Б.