МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП-004024-300518
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Эмоксиакти

Раствор для инфузий 5 мг/мл

Белорусско-голландское совместное предприятие общество с ограниченной ответственностью «Фармлэнд» (СП ООО «Фармлэнд»), Республика Беларусь

Изменение № 1

Дата внесения Изменения «____» 300518 201__ г.

Старая редакция	Новая редакция
Торговое наименование: Эмоксипин-Акти	**Торговое наименование:** Эмоксиакти
Фармакологические свойства	**Фармакологические свойства**
Фармакодинамика.	*Фармакодинамика.*
Эмоксипин-Акти оказывает благоприятное влияние на систему свертывания крови: тормозит агрегацию тромбоцитов, снижает общий индекс коагуляции, удлиняет время свертывания крови. Стабилизирует мембраны клеток кровеносных сосудов и эритроцитов, повышает резистентность эритроцитов к механической травме и гемолизу. Обладает ангиопротекторными свойствами. Улучшает микроциркуляцию.	Эмоксиакти оказывает благоприятное влияние на систему свертывания крови: тормозит агрегацию тромбоцитов, снижает общий индекс коагуляции, удлиняет время свертывания крови. Стабилизирует мембраны клеток кровеносных сосудов и эритроцитов, повышает резистентность эритроцитов к механической травме и гемолизу. Обладает ангиопротекторными свойствами. Улучшает микроциркуляцию.
Эффективно ингибирует свободно-радикальное окисление липидов биомембран, повышает активность антиоксидантных ферментов. Стабилизирует цитохром Р-450, обладает	Эффективно ингибирует свободно-радикальное окисление липидов биомембран, повышает активность антиоксидантных ферментов. Стабилизирует цитохром Р-450, обладает

антитоксическим действием. В экстремальных ситуациях, сопровождающихся усилением перекисного окисления липидов и гипоксией, оптимизирует биоэнергетические процессы. Повышает устойчивость мозга к гипоксии и ишемии. При нарушениях мозгового кровообращения (ишемических и геморрагических) способствует коррекции вегетативных дисфункций, облегчает восстановление интегративной деятельности мозга, улучшает мнестические функции. Оказывает гиполипидемическое действие, снижает синтез триглицеридов. Препарат обладает выраженным кардиопротективным действием. Расширяет коронарные сосуды, уменьшает ишемическое повреждение миокарда. При инфаркте миокарда ограничивает величину очага некроза, ускоряет репаративные процессы, способствует нормализации метаболизма миокарда. Оказывает благоприятное влияние на клиническое течение инфаркта миокарда, уменьшая частоту развития острой сердечной недостаточности. Способствует регуляции окислительно-восстановительной системы при недостаточности кровообращения. *Фармакокинетика*	антитоксическим действием. В экстремальных ситуациях, сопровождающихся усилением перекисного окисления липидов и гипоксией, оптимизирует биоэнергетические процессы. Повышает устойчивость мозга к гипоксии и ишемии. При нарушениях мозгового кровообращения (ишемических и геморрагических) способствует коррекции вегетативных дисфункций, облегчает восстановление интегративной деятельности мозга, улучшает мнестические функции. Оказывает гиполипидемическое действие, снижает синтез триглицеридов. Препарат обладает выраженным кардиопротективным действием. Расширяет коронарные сосуды, уменьшает ишемическое повреждение миокарда. При инфаркте миокарда ограничивает величину очага некроза, ускоряет репаративные процессы, способствует нормализации метаболизма миокарда. Оказывает благоприятное влияние на клиническое течение инфаркта миокарда, уменьшая частоту развития острой сердечной недостаточности. Способствует регуляции окислительно-восстановительной системы при недостаточности кровообращения. *Фармакокинетика*

При внутривенном введении в дозе 10 мг/кг отмечен низкий период полувыведения ($T_{1/2}$ — 18 мин, что свидетельствует о высокой скорости элиминации препарата из крови). Величина константы элиминации — 0,041 мин; общий клиренс — 214,8 мл/мин; кажущийся объем распределения $V_{каж.}$ — 5,2 л. Препарат быстро проникает в органы и ткани, где происходит его депонирование и метаболизм. Обнаружено 5 метаболитов препарата, представленных деалкилированными и конъюгированными продуктами его превращения. Метаболиты препарата Эмоксипин-Акти экскретируются почками. В значительных количествах в печени обнаруживается 2-этил-6-метил-3-оксипиридин-фосфат.	При внутривенном введении в дозе 10 мг/кг отмечен низкий период полувыведения ($T_{1/2}$ — 18 мин, что свидетельствует о высокой скорости элиминации препарата из крови). Величина константы элиминации — 0,041 мин; общий клиренс — 214,8 мл/мин; кажущийся объем распределения $V_{каж.}$ — 5,2 л. Препарат быстро проникает в органы и ткани, где происходит его депонирование и метаболизм. Обнаружено 5 метаболитов препарата, представленных деалкилированными и конъюгированными продуктами его превращения. Метаболиты препарата Эмоксиакти экскретируются почками. В значительных количествах в печени обнаруживается 2-этил-6-метил-3-оксипиридин-фосфат.
При патологических состояниях, например, в случае коронарной окклюзии, фармакокинетика препарата изменяется. Уменьшается скорость выведения, вследствие чего возрастает биодоступность препарата. Увеличивается время его нахождения в кровеносном русле, что может быть связано с обратным поступлением препарата из депо, в том числе из ишемизированного миокарда.	При патологических состояниях, например, в случае коронарной окклюзии, фармакокинетика препарата изменяется. Уменьшается скорость выведения, вследствие чего возрастает биодоступность препарата. Увеличивается время его нахождения в кровеносном русле, что может быть связано с обратным поступлением препарата из депо, в том числе из ишемизированного миокарда.
Способ применения и дозы В неврологии и нейрохирургии раствор препарата Эмоксипин-Акти для инфузий применяют внутривенно капельно в суточной дозе 10 мг/кг (2 мл/кг) в течение 10–12 дней. Вводят со скоростью 20–30 капель в минуту.	**Способ применения и дозы** В неврологии и нейрохирургии раствор препарата Эмоксиакти для инфузий применяют внутривенно капельно в суточной дозе 10 мг/кг (2 мл/кг) в течение 10–12 дней. Вводят со скоростью 20–30 капель в минуту.

В кардиологии начинают с внутривенного капельного (20–40 капель в минуту) введения 120–180 мл препарата (600–900 мг препарата) 1–3 раза в сутки в течение 5–15 дней в зависимости от течения заболевания. При лечении препаратом следует контролировать артериальное давление и функциональное состояние свертывающей и противосвертывающей систем крови. **Взаимодействие с другими лекарственными средствами** Запрещается смешивать Эмоксипин-Акти с другими лекарственными препаратами (фармацевтически не совместим с другими лекарственными средствами).	В кардиологии начинают с внутривенного капельного (20–40 капель в минуту) введения 120–180 мл препарата (600–900 мг препарата) 1–3 раза в сутки в течение 5–15 дней в зависимости от течения заболевания. При лечении препаратом следует контролировать артериальное давление и функциональное состояние свертывающей и противосвертывающей систем крови. **Взаимодействие с другими лекарственными средствами** Запрещается смешивать Эмоксиакти с другими лекарственными препаратами (фармацевтически не совместим с другими лекарственными средствами).

Генеральный директор
ООО «Актифарм»



подпись

Руденко Д.А.
ФИО