МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

ЭМОКСИБЕЛ

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Эмоксибел

Группировочное название: метилэтилпиридинол

Химическое название: 6-метил-2-этилпиридин-3-ола гидрохлорид

Лекарственная форма: капли глазные

Состав на 1 мл: *активное вещество:* метилэтилпиридинола гидрохлорид (эмоксипин) - 10 мг; *вспомогательные вещества:* натрия сульфит – 3 мг, натрия бензоат – 2 мг, калия дигидрофосфат – 6,2 мг, натрия гидрофосфата додекагидрат – 7,5 мг, вода для инъекций – до 1 мл.

Описание: прозрачная бесцветная или с желтым оттенком жидкость.

Фармакотерапевтическая группа: антиоксидантное средство

Код АТХ: S01XA

Фармакологическое действие

Фармакодинамика. Антиоксидант (лекарственное средство, препятствующее перекисному окислению липидов клеточных мембран), обладающий ангиопротекторной (повышающей устойчивость сосудов), антиагрегационной (препятствующей склеиванию тромбоцитов) и антигипоксической (повышающей устойчивость ткани к нехватке кислорода) активностью.

Уменьшает проницаемость капилляров и укрепляет сосудистую стенку (ангиопротектор). Уменьшает вязкость крови и агрегацию тромбоцитов (антиагрегант). Ингибитор свободнорадикальных процессов, обладает

95730

мембраностабилизирующим действием.

Обладает ретинопротекторными свойствами, защищает сетчатку и другие ткани глаза от повреждающего действия света высокой интенсивности. Способствует рассасыванию внутриглазных кровоизлияний, снижает свертываемость крови, улучшает микроциркуляцию глаза. Стимулирует репаративные процессы в роговице (в том числе в раннем послеоперационном и постраневом периоде).

Фармакокинетика. Быстро проникает в ткани глаза, где происходит его депонирование и метаболизм. В тканях глаза концентрация выше, чем в крови. Обнаружено 5 метаболитов, представленных дезалкилированными и конъюгированными продуктами метаболизма. Метаболизируется в печени. В значительных количествах в печени обнаруживается активный метаболит 2-этил-6-метил-3-оксипиридинфосфат. Далее в крови под влиянием щелочной фосфатазы происходит расщепление 2-этил-6-метил-3-оксипиридинафосфата на фосфорную кислоту и 3-оксипиридин. Метаболиты экскретируются почками.

Показания к применению

Применяется у взрослых при следующих заболеваниях и состояниях:

- субконъюнктивальные и внутриглазные кровоизлияния различного генеза;
- травма, воспаление и ожог роговицы;
- дистрофические заболевания роговицы;
- осложненная миопия;
- защита роговицы (при ношении контактных линз).

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата, беременность, период лактации, детский возраст до 18 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Препарат противопоказан при беременности.

При необходимости назначения препарата в период лактации грудное вскармливание необходимо прекратить.

Способ применения и дозы

Препарат закапывают в конъюнктивальный мешок по 1-2 капли 2 - 3 раза в день.

95730

Продолжительность курса лечения зависит от течения заболевания (обычно составляет 3 - 30 дней) и определяется врачом. При наличии показаний и хорошей переносимости продолжительность курса лечения может составлять до 6 месяцев. Повторные курсы лечения могут проводиться 2-3 раза в год.

Рекомендации по использованию флаконов с крышками-капельницами: перед применением препарата удалить с флакона алюминиевый колпачок, снять резиновую пробку и закрыть флакон крышкой-капельницей, предварительно освобожденной от упаковки. Затем снять колпачок с крышки-капельницы, перевернуть флакон, закапать необходимое количество капель препарата. После применения флакон вернуть в вертикальное положение и надеть колпачок на крышку-капельницу.

Побочные действия

Ощущение жжения, зуд в глазу, кратковременная гиперемия конъюнктивы, редко: местные аллергические реакции.

Передозировка

Не описана.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и работу с механизмами

Влияние на управление транспортными средствами или работу со сложной техникой не описано.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Препарат не следует смешивать с другими лекарственными средствами.

Особые указания

Перед инстилляцией мягкие контактные линзы следует удалить, вновь надеть линзы можно не ранее чем через 20 минут.

При необходимости одновременного применения других глазных капель препарат закапывают последним не ранее, чем через 15 минут (после полного всасывания предыдущего лекарственного средства).

Форма выпуска

Капли глазные 1 %. По 5 мл во флаконы.

95730

По 1 флакону вместе с крышкой-капельницей и инструкцией по применению помещают в пачку картонную.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Флакон после вскрытия хранить при температуре не выше 25 °С в течение 4 недель.

Не использовать после истечения срока годности.

Условия отпуска

По рецепту.

Производитель/претензии потребителей направлять по адресу:

РУП «Белмедпрепараты»,

Республика Беларусь, 220007, г. Минск,

ул. Фабрициуса, 30,

т./ф.: (+375 17) 220-37-16,

e-mail: medic@belmedpreparaty.com.

Зам. генерального директора по качеству
РУП «Белмедпрепараты» С.В. Шляхтин

МЗ РФ
ФГБУ ЭКСПЕРТНЫЙ ОТЧЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДЛЯ ДАННОЙ ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА НЦЭСМП
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

95730