МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Эмоксибел,

раствор для внутривенного и внутримышечного введения 30 мг/мл

РУП «Бе́лмедпрепараты», Республика Беларусь

Изменение № 1

Дата внесения Изменения «28 02 11 20 г.

Старая редакция	Новая редакция
Форма выпуска. Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 30 мг/мл. По 5 мл в ампулы. По 5 ампул помещают в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной или бумаги металлизированной или бумаги упаковочной с полимерным покрытием. 1 или 2 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению и скарификатором ампульным помещают в пачку из картона. При использовании ампул с кольцом излома допускается упаковка ампул без скарификатора ампульного.	**Форма выпуска.** Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 30 мг/мл. По 5 мл в ампулы. По 5 ампул помещают в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой. 1 или 2 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению и скарификатором ампульным помещают в пачку из картона. При использовании ампул с кольцом излома допускается упаковка ампул без скарификатора ампульного. По 10 мл во флаконы. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. Упаковка для стационаров: 40 флаконов с равным количеством инструкций по меди-

Старая редакция	Новая редакция
	цинскому применению в коробки из картона.

Заместитель генерального директора
по качеству
РУП «Белмедпрепараты»



Л.И Воробьёва