

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

ЭСЛИДИН®

МИНЗДРАВ РОССИИ

ЛСР-001048/08- 311016
СОГЛАСОВАНО

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Эслидин®

Международное непатентованное или группировочное наименование: Метионин +
Фосфолипиды

Лекарственная форма: Капсулы

Состав

Одна капсула содержит:

действующие вещества: фосфолипиды (Липоид ППЛ-400) (в пересчете на 100 %
содержание полиненасыщенных фосфолипидов из соевого лецитина (фракция PPL)) –
300 мг, метионин - 100 мг;

вспомогательные вещества: соевых бобов масло - до 550 мг.

Капсулы твердые желатиновые:

корпус и крышечка капсулы: титана диоксид, краситель железа оксид черный, краситель
железа оксид красный, краситель железа оксид желтый, вода, желатин.

Описание

Твердые желатиновые капсулы № 0, корпус и крышечка капсулы коричневого цвета.
Содержимое капсул – желто-коричневая или коричневая однородная масса от
мазеобразной до более плотной консистенции с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа: гепатопротекторное средство

Код АТХ: A05C

Фармакологическое действие

Комбинированный препарат, оказывает гепатопротекторное действие, нормализует все
виды обмена веществ (жировой, белковый, углеводный).

Метионин, один из активных компонентов препарата, - это незаменимая аминокислота,
которая является источником подвижных метильных групп. Метионин необходим для
синтеза холина. Увеличение содержания холина способствует увеличению синтеза
эндогенных (внутренних) фосфолипидов и уменьшению отложения в печени
нейтрального жира. Метионин также необходим для обезвреживания ксенобиотиков. При
атеросклерозе снижает концентрацию холестерина и повышает концентрацию

фосфолипидов крови.

Эссенциальные фосфолипиды – это незаменимые факторы для развития и функционирования клеток печени. Основная фракция эссенциальных фосфолипидов в препарате представлена фосфатидилхолином (73%), который является основным компонентом биологических мембран. Попадая в организм, фосфатидилхолин восстанавливает целостность мембран пораженных клеток печени и активирует расположенные в мембране фосфолипидзависимые ферменты, нормализуя тем самым проницаемость и усиливая дезинтоксикационный и экскреторный потенциал клеток печени.

Метионин и эссенциальные фосфолипиды усиливают действие друг друга, являясь источником эндогенных (внутренних) и экзогенных (поступающих в организм) фосфолипидов соответственно, улучшают функциональное состояние клеток печени и оказывают гепатопротекторный (защитный) эффект.

Метионин также участвует в обмене серосодержащих аминокислот, в синтезе эpineфрина, креатинина и других биологически активных соединений, преобразует действие гормонов, витаминов (B12, аскорбиновой, фолиевой кислот), ферментов, белков, участвует в реакциях переметилирования, дезаминирования, декарбоксилирования.

Эслидин® восстанавливает функцию печени, повышает её дезинтоксикационную способность, а также нормализует жировой, углеродный и белковый обмен веществ в организме.

Показания к применению

Препарат применяется в гастроэнтерологии, дерматологии, неврологии, кардиологии.

Гастроэнтерология: жировая дистрофия печени различной этиологии; острый и хронический гепатит (кроме вирусного); цирроз печени; токсическое поражение печени – алкогольное, наркотическое, лекарственное; нарушение функции гепатоцитов (как осложнение при других заболеваниях); пред- и послеоперационное лечение при операциях в области гепатобилиарной зоны.

Дерматология: псориаз в составе комплексной терапии.

Неврология: атеросклероз сосудов головного мозга в составе комплексной терапии.

Эндокринология: сахарный диабет в составе комплексной терапии; истощение, дистрофия.

Кардиология: атеросклероз коронарных артерий в составе комплексной терапии.

Противопоказания

Гиперчувствительность (повышенная чувствительность) к компонентам препарата; тяжелая печеночная недостаточность, печеночная энцефалопатия, вирусный гепатит, детский возраст до 3 лет.

С осторожностью

С осторожностью возможно применение в период беременности и у детей от 3 до 7 лет, а также при почечной недостаточности (из-за опасности нарастания гиперазотемии).

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Исследований, подтверждающих безопасность Эслидина® для плода и безопасность для ребенка во время кормления грудью, не проводилось. Применение препарата при беременности и в период лактации возможно только по назначению врача в случаях, когда предполагаемая польза для матери превышает возможный риск для плода и ребенка.

Способ применения и дозы

Препарат принимают внутрь, во время еды, проглатывая целиком, с достаточным количеством воды.

При заболеваниях печени, атеросклерозе коронарных артерий и сосудов головного мозга, сахарном диабете, дистрофии и истощении принимать по 2 капсулы 3 раза в день. Рекомендуемый курс лечения – 3 месяца, минимальный – 1 месяц.

При псориазе – по 2 капсулы 3 раза в день. Рекомендуемый курс лечения – 2 недели.

Детям старше 7 лет при заболеваниях печени, сахарном диабете, жировой дистрофии печени – по 2 капсулы 3 раза в день, в течение 1 - 3 месяцев.

При псориазе детям старше 7 лет – по 2 капсулы 3 раза в день, в течение 2 недель.

Применение препарата у детей от 3 до 7 лет – по 1 капсуле 3 раза в день, в течение 1-3 месяцев.

Побочное действие

Аллергические реакции.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

При одновременном применении с леводопой её эффективность уменьшается.

Особые указания

Препарат следует назначать в балансе с другими аминокислотами, т.к. несбалансированное применение метионина в больших дозах может оказать повреждающее действие на клетки печени и других органов.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на управление транспортными средствами, работу с механизмами и выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Капсулы 100 мг+300 мг. По 10 или 15 капсул в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной.

2, 3, 4, 5, 6, 9 или 10 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по применению лекарственного препарата помещают в пачку из картона.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель

АО «Нижфарм», Россия

603950, г. Нижний Новгород,

ул. Салганская, д. 7

Тел.: (831) 278-80-88, факс: (831) 430-72-28

E-mail: med@stada.ru

или

ООО «МАКИЗ-ФАРМА», Россия

109029, г. Москва,

Автомобильный проезд, д. 6, стр. 5

Тел.: (495) 974-70-00, факс: (495) 974-11-10

или

ООО «Хемофарм», Россия

249030, Калужская обл., г. Обнинск, Киевское шоссе, д. 62

Тел.: (48439) 90-500, факс: (48439) 90-525

Наименование и адрес юридического лица, на имя которого выдано регистрационное удостоверение/организация, принимающая претензии

АО «Нижфарм», Россия

603950, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д. 7

Тел.: (831) 278-80-88, факс: (831) 430-72-28

E-mail: med@stada.ru

По доверенности АО «Нижфарм»



Е.А. Агафонова