ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата МЕТРОГЕКС®

Регистрационный номер:

Торговое название: Метрогекс®

Лекарственная форма: гель стоматологический

Состав: в 10 г геля
активные вещества: метронидазола бензоат 0,160 г (эквивалентно 0,100 г метронидазола), хлоргексидина глюконат 20% раствор 0,025 г (эквивалентно 0,005 г хлоргексидина глюконата);
вспомогательные вещества: бутилгидроксианизол, бутилгидрокситолуен, натрия сахаринат, полисорбат 60, ментол, троламин, карбомер-934, метилпарагидроксибензоат, пропилпарагидроксибензоат, пропиленгликоль, вода.

Описание: белый или почти белый однородный гель с приятным запахом.

Фармакотерапевтическая группа: противомикробное средство.

Код АТХ: [A01AB11]

Фармакологическое действие
Метрогекс – препарат для лечения и профилактики воспалительных заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости рта. Эффективность препарата обусловлена наличием в его составе двух антибактериальных компонентов.
Метронидазол – производное нитроимидазола, обладает высокой активностью в отношении анаэробных бактерий, вызывающих заболевания пародонта: *Porphyromonas gingivalis*, *Prevotella intermedia*, *Prevotella denticola*, *Fusobacterium fusiformis*, *Wolinella recta*, *Treponema spp.*, *Eikenella corrodens*, *Borrelia vincenti*, *Bacteroides melaninogenicus*, *Selenomonas spp.*
Хлоргексидин - антисептик широкого спектра, обладает бактерицидным действием. Активен в отношении вегетативных форм грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов, а также дрожжей, дерматофитов и липофильных вирусов.
Фармакокинетика
При местном применении препарата Метрогекс активные вещества практически не подвергаются системной абсорбции и не оказывают системного действия.

Показания к применению
Воспалительные заболевания пародонта и слизистой оболочки полости рта:
– острый и хронический гингивит
– острый некротический язвенный гингивит Винцента
– острый и хронический пародонтит
– юношеский пародонтит
– пародонтоз, осложненный воспалением
– афтозный стоматит
– пульпит
– хейлит
– воспаление слизистой оболочки полости рта при ношении протезов
– постэкстракционный альвеолит (воспаление лунки после удаления зуба)

Противопоказания
Гиперчувствительность к компонентам препарата, а так же к производным нитроимидазола.

С осторожностью
Беременность, период лактации.

Способ применения и дозы
Препарат предназначен только для применения в стоматологической практике.
Взрослым и детям старше 6 лет при воспалении десен (гингивит) гель Метрогекс наносится на область десен 2 раза в день, смывать гель не рекомендуется. Длительность курса лечения составляет, в среднем, 7–10 дней. После нанесения геля следует воздержаться от питья и приема пищи в течение 30 минут.
При пародонтите, после снятия зубных отложений, пародонтальные карманы обрабатываются гелем Метрогекс и производится аппликация геля на область десен. Время экспозиции – 30 минут. Количество процедур зависит от тяжести заболевания. В дальнейшем аппликации геля больной может проводить самостоятельно. Метрогекс наносится на область десен два раза в день в течение 7–10 дней.
При афтозном стоматите гель Метрогекс наносится на пораженную область слизистой оболочки полости рта 2 раза в день в течение 7–10 дней.
Для профилактики обострений хронического гингивита и пародонтита гель Метрогекс наносят на область десен 2 раза в день в течение 7–10 дней. Профилактические курсы лечения проводятся 2–3 раза в год.
Для профилактики постэкстракционного альвеолита после удаления зуба лунка обрабатывается гелем Метрогекс, затем гель применяется амбулаторно 2-3 раза в день в течение 7–10 дней.

Побочные действия
При местном применении геля Метрогекс риск развития системных побочных явлений невелик, однако иногда могут наблюдаться: металлический привкус во рту, головная боль, аллергические реакции (кожная сыпь, зуд, крапивница).

Беременность и период лактации
Опыт применения у беременных и кормящих женщин отсутствует.

Особые указания
Применение геля Метрогекс не заменяет гигиенической чистки зубов, поэтому во время курса лечения препаратом чистка зубов должна быть продолжена.
Избегать попадания в глаза.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами
При местном применении в рекомендованных дозах системного взаимодействия геля Метрогекс с другими лекарственными средствами не выявлено.

Форма выпуска
Гель стоматологический, 10 г. По 10 г геля в тубе из ламинированного алюминия, 1 туба в картонной пачке с инструкцией по применению.

Срок годности
2 года. Не использовать препарат после истечения срока годности.

Условия хранения:
При температуре не выше 25°С. Не замораживать.
Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска из аптек
Отпускается без рецепта врача.

Производитель
"Д-р Редди'с Лабораторис Лтд."
Индия, Андхра Прадеш, г.Хайдерабад

Произведено: «Груп Фармасьютикалс Лтд.»

Претензии потребителей направлять по адресу:
Представительство фирмы "Д-р Редди'с Лабораторис Лтд.":
115035, г. Москва, Овчинниковская наб. д.20, стр.1
тел: (495) 795-39-39, 783-29-01
факс: (495) 795-39-08

И.о. Директора ИДКЭЛ А.Н. Васильев

Глава Представительства М.В. Рамана