МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛСР-000084/10- 301216
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Инструкция

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Моксонитекс

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

0,2 мг, 0,3 мг, 0,4 мг

Сандоз д.д., Словения

Изменение № 6

Срок введения изменений с «__»_____ 20___г. 301216

Старая редакция	**Новая редакция**
Состав: 1 таблетка содержит: <u>Дозировка 0,2 мг</u> *Активное вещество:* моксонидин 0,2 мг. *Вспомогательные вещества:* лактозы моногидрат – 94,5 мг, повидон-К25 – 2,0 мг, кросповидон – 3,0 мг, магния стеарат – 0,3 мг. *Состав пленочной оболочки:* опадрай Y 1 7000 – 3,498 мг (титана диоксид – 1,093 мг, гипромеллоза – 2,186 мг, макрогол-400 – 0,219), краситель железа оксид красный – 0,002 мг. <u>Дозировка 0,3 мг</u>	**Состав:** 1 таблетка содержит: *Действующее вещество:* моксонидин 0,2 мг / 0,3 мг / 0,4 мг. *Вспомогательные вещества:* лактозы моногидрат, повидон-К-25, кросповидон, магния стеарат. *Состав пленочной оболочки:* опадрай Y-1-7000 (титана диоксид, гипромеллоза, макрогол-400), краситель железа оксид красный.

Активное вещество: моксонидин 0,3 мг. *Вспомогательные вещества:* лактозы моногидрат – 94,4 мг, повидон-К25 – 2,0 мг, кросповидон – 3,0 мг, магния стеарат – 0,3 мг. *Состав пленочной оболочки:* опадрай Y 1 7000 – 3,488 мг (титана диоксид – 1,090 мг, гипромеллоза – 2,180 мг, макрогол-400 – 0,218), краситель железа оксид красный – 0,012 мг. <u>Дозировка 0,4 мг</u> *Активное вещество:* моксонидин 0,4 мг. *Вспомогательные вещества:* лактозы моногидрат – 94,3 мг, повидон-К25 – 2,0 мг, кросповидон – 3,0 мг, магния стеарат – 0,3 мг. *Состав пленочной оболочки:* опадрай Y 1 7000 – 3,465 мг (титана диоксид – 1,083 мг, гипромеллоза – 2,165 мг, макрогол-400 – 0,217), краситель железа оксид красный – 0,035 мг.	

Медицинский директор
ЗАО «Сандоз»

Королёва М. Г.