МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Внимательно прочитайте эту инструкцию перед тем, как начать использование этого лекарства.
Это лекарство отпускается без рецепта. Для достижения оптимальных результатов его следует использовать, строго выполняя все рекомендации, изложенные в инструкции.
Сохраните инструкцию, она может потребоваться вновь.
Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к врачу.

Инструкция по применению лекарственного препарата для медицинского применения МАРИМЕР ФОРТЕ

Торговое название: МАРИМЕР ФОРТЕ

Лекарственная форма: аэрозоль назальный

Состав на 100 мл
Действующее вещество:
Стерильная очищенная морская вода .....60 мл
Вспомогательное вещество:
Вода очищенная до 100 мл

Описание
Бесцветная прозрачная жидкость.

Фармакотерапевтическая группа
Средство лечения заболеваний носа.

Код АТХ: R01AX10

Фармакологические свойства
Способствует поддержанию нормального физиологического состояния слизистой оболочки носа. Способствует разжижению слизи и облегчает ее удаление из носа. Микроэлементы, входящие в состав препарата, улучшают функцию мерцательного эпителия, что усиливает резистентность слизистой оболочки носа к болезнетворным бактериям и вирусам. При аллергических ринитах способствует удалению аллергенов со слизистой оболочки носа.
Микродиффузионная система распыления препарата обеспечивает глубокое и мягкое орошение слизистой оболочки носа, что способствует эффективному воздействию микроэлементов.

Показания для применения
- Острые и хронические воспалительные заболевания носа, придаточных пазух и носоглотки
- Профилактика инфекционных заболеваний носа и носоглотки
- Аллергический и вазомоторный риниты
- Профилактика воспалительных процессов после оперативных вмешательств
- Ежедневная гигиена носовой полости для сохранения защитных свойств слизистой оболочки в условиях повышенной сухости или загрязнения воздуха (кондиционирование, центральное отопление и др.)

68903

Противопоказания для применения
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Детский возраст до 1 года.

Способ применения и дозы
Препарат применяется интраназально.
По одному впрыскиванию в каждый носовой ход с лечебными целями 4-6 раз в день, с гигиеническими целями 1-4 раза в день.

Побочные действия
Возможны аллергические реакции.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Препарат не оказывает системного действия на организм, взаимодействия с другими лекарственными препаратами не отмечено. Возможно применение с другими лекарственными средствами в составе комбинированной терапии.

Применение в период беременности и кормления грудью
Возможно применение при беременности и в период лактации.

Особые указания
Необходима консультация врача, если препарат применяется после операции.

Влияние на способность к управлению транспортными средствами и механизмами
Препарат не оказывает влияния на способность к управлению транспортными средствами и механизмами.

Форма выпуска
Аэрозоль назальный.
По 30, 50, 100 мл препарата в алюминиевый баллон с распылительной насадкой из полиэтилена и полипропиленовым колпачком.
Баллон вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

Срок годности
3 года.
Не применять по истечению срока годности.

Условия хранения
При температуре не выше 25°С.
Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска из аптек
Без рецепта.

Название и адрес фирмы-производителя и адрес места производства
Лаборатории ЖИЛЬБЕР, Франция
928, Авеню генерала де Голля,
14200 ЭРУВИЛЬ СЕН-КЛЭР

Представлено в России и СНГ:
«Никомед Австрия ГмбХ»,
119048 Москва, ул. Усачева 33/2, строение 6
Тел.: (495) 933-55-11
Факс: (495) 502-16-25

Представитель компании А.О.Зенкина

LABORATOIRES GILBERT
B.P. 115
928, Avenue du Général de Gaulle
14204 HÉROUVILLE-ST-CLAIR CEDEX (F)

МЗ РФ
ФГБУ
ЭКСПЕРТНЫЙ ОТЧЕТ
ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДЛЯ ПЛАНШЕТА
ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА
0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
ПРОДЛЕН

68903