ИНСТРУКЦИЯ

(информация для специалистов)
по медицинскому применению препарата

ФЛУИМАРИН

Регистрационный номер:
Торговое название: Флуимарин.
Лекарственная форма: аэрозоль назальный.

Состав на 1000 мл раствора:
действующее вещество: вода морская 290 мл;
вспомогательные вещества: вода для инъекций до 1000 мл.

Описание: прозрачный бесцветный или практически бесцветный раствор.

Фармакологическая группа: средство лечения заболеваний носа.

Код АТХ: R01AX.

Фармакологические свойства

ФЛУИМАРИН содержит чистую природную подвергшуюся стерильному фильтрованию морскую воду с природными минералами и олигоэлементами из Атлантического океана, которая по своей концентрации изотонична слизистой оболочке носа (соответствует 0,9% раствору натрия хлорида).

Препарат разжижает назальный секрет, способствует исчезновению корок в носу и облегчает процедуру очищения полости носа.

Препарат не вызывает привыкания и лекарственной зависимости.
Фармакокинетика. При местном применении препарат не абсорбируется.

Показания к применению

Все типы ринитов, включая аллергический, для очищения, увлажнения слизистой полости носа с целью уменьшения воздействия, как аллергенов, так и фактора холодового воздействия.

Для гигиены слизистой носа и профилактики заболеваний носа и носоглотки.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата..

Применение при беременности и лактации

Применение препарата в период беременности и лактации разрешается.

Способ применения и дозы

Если нет других указаний, следует придерживаться нижеуказанных рекомендаций по применению ФЛУИМАРИНа.

Взрослым и детям с 2-х лет вводят по 1-2 дозы аэрозоля (1-2 нажатия на клапан) в каждый носовой ход 3-6 раз в день по мере необходимости.

Детям до 2-х лет вводят по 1 дозе аэрозоля (1 нажатие на клапан) в каждый носовой ход 3-6 раз в день по мере необходимости.

Инструкция по применению аэрозоля

1. Удалить защитный колпачок с носового адаптера.
2. Ввести носовой адаптер в один носовой ход.
3. Активировать распылитель однократным нажатием.
4. Повторить вышеописанные действия для другого носового хода.
5. После применения аэрозоля вытереть носовой адаптер, например, чистым бумажным полотенцем.
6. Закрыть носовой адаптер защитным колпачком.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции.

Передозировка

Случаи передозировки неизвестны.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Случаи несовместимости с другими препаратами не описаны.

При одновременном назначении ФЛУИМАРИНа с другими лекарственными препаратами для назального применения сначала нужно применить ФЛУИМАРИН.

Особые указания

При применении ФЛУИМАРИНа у детей до 2-х лет их нужно положить не на спину, а на бок. Голову нужно слегка запрокинуть.

Препарат не содержит консервантов, так как специальная технология его производства позволяет предотвратить проникновение микроорганизмов во флакон с раствором при многократном использовании.

Форма выпуска

По 15 мл раствора (около 110 доз) в пластиковых флаконах с распылителем; по 1 или 3 флакона вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в картонную пачку. В упаковку с 3 флаконами дополнительно вкладывают стикер-маркер для флаконов.

Срок годности

2 (два) года. Не использовать позже даты, указанной на упаковке.

После вскрытия флакона его содержимое может быть использовано в течение 6 недель.

Условия хранения

Хранить при температуре ниже +30°С в недоступном для детей месте.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Предприятие-производитель

МПЦ Интернейшнл С.А.
26, Бульвар Руаяль
L-2449 Люксембург
тел. 00352 22 99 99 55 46
факс 00352 22 99 99 55 49

Директор ИДКЭЛС
проф. Чельцов В.В.

Замбон Груп С.п.А., Италия
Менеджер по регистрации
Коростелева Е.Е.