ЛС-000479-140812

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Флуимарин

аэрозоль назальный

Замбон С.П.А., Италия

произведено

Урсафарм Арцнаймиттель ГмбХ энд Ко.КГ, Германия

Изменение № 4

Дата внесения Изменения «____» 140812 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Лекарственная форма: аэрозоль назальный	**Лекарственная форма:** спрей назальный
Способ применения и дозы	**Способ применения и дозы**
Если нет других указаний, следует придерживаться нижеуказанных рекомендаций по применению ФЛУИМАРИНа.	Если нет других указаний, следует придерживаться нижеуказанных рекомендаций по применению ФЛУИМАРИНа.
Взрослым и детям с 2-х лет вводят по 1-2 дозы аэрозоля (1-2 нажатия на клапан) в каждый носовой ход 3-6 раз в день по мере необходимости.	Взрослым и детям с 2-х лет вводят по 1-2 дозы спрея (1-2 нажатия на клапан) в каждый носовой ход 3-6 раз в день по мере необходимости.
Детям до 2-х лет вводят по 1 дозе аэрозоля (1 нажатие на клапан) в каждый носовой ход 3-6 раз в день по мере необходимости.	Детям до 2-х лет вводят по 1 дозе спрея (1 нажатие на клапан) в каждый носовой ход 3-6 раз в день по мере необходимости.

Изменение № 4 к инструкции по применению препарата Флуимарин С.2

Инструкция по применению аэрозоля 1. Удалить защитный колпачок с носового адаптера. 2. Ввести носовой адаптер в один носовой ход. 3. Активировать распылитель однократным нажатием. 4. Повторить вышеописанные действия для другого носового хода. 5. После применения аэрозоля вытереть носовой адаптер, например, чистым бумажным полотенцем. 6. Закрыть носовой адаптер защитным колпачком.	**Инструкция по применению спрея** 1. Удалить защитный колпачок с носового адаптера. 2. Ввести носовой адаптер в один носовой ход. 3. Активировать распылитель однократным нажатием. 4. Повторить вышеописанные действия для другого носового хода. 5. После применения спрея вытереть носовой адаптер, например, чистым бумажным полотенцем. 6. Закрыть носовой адаптер защитным колпачком.
Форма выпуска По 15 мл раствора (около 110 доз) в пластиковых флаконах с распылителем, по 1 или 3 флакона вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в картонную пачку. В упаковку в 3 флаконами дополнительно вкладывают стикер-маркер для флаконов.	**Форма выпуска** Спрей назальный. По 15 мл раствора (не менее 100 доз) в пластиковых флаконах с распылителем, по 1 или 3 флакона вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в картонную пачку. В упаковку с 3 флаконами дополнительно вкладывают стикер-маркер для флаконов.

ЛС-000479-140812

Изменение № 4 к инструкции по применению препарата Флуимарин С.3

Условия хранения Хранить при температуре ниже + 30^{0}С в недоступном для детей месте. **Производитель** Урсафарм Арцнаймиттель ГмбХ энд Ко.КГ Индустриештрассе, Д-66129 Саарбрюкен, Германия	**Условия хранения** Хранить при температуре не выше 30 ^{0}С в недоступном для детей месте. **Производитель** Урсафарм Арцнаймиттель ГмбХ Индустриештрассе, Д-66129 Саарбрюкен, Германия

Руководитель отдела регистрации Кокорникова О.Ф.