МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

ТИОТРИАЗОЛИН®

раствор для внутривенного и внутримышечного введения 25 мг/мл

АО «Галичфарм»

Изменение № 2

Дата внесения Изменения «05» марта 2012 г.

Старая редакция	Новая редакция
Форма выпуска Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 25 мг/мл. По 2 мл в ампулы типа В-2 из стекла марки НС-3 или в ампулы типа ВО-2 или ИП-2 из стекла марки УСП-1. Или по 4 мл в ампулы типа В-5 из стекла марки НС-3 или в ампулы типа ВО-5 или ИП-5В из стекла марки УПС. По 10 ампул вместимостью 2 мл или 4 мл вместе с инструкцией по медицинскому применению и	**Форма выпуска** Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 25 мг/мл. По 2 мл или 4 мл в ампулы или в ампулы с кольцом излома красного цвета или в ампулы с точкой излома емкостью 2 мл или 5 мл соответственно. 10 ампул вместимостью 2 мл или 5 мл вместе с инструкцией по медицинскому применению и скарификатором ампульным вкладывают в коробку с гофрированным вкладышем. Коробку обклеивают этикеткой-бандеролью.

скарификатором ампульным вкладывают в коробку с гофрированным вкладышем. Коробку обклеивают этикеткой-бандеролью. По 10 ампул вместимостью 2 мл в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной. Одну упаковку вместе с инструкцией по медицинскому применению и скарификатором ампульным вкладывают в пачку. Или по 5 ампул вместимостью 4 мл в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной. Две упаковки вместе с инструкцией по медицинскому применению и скарификатором ампульным вкладывают в пачку. При использовании ампул с кольцом излома вложение скарификаторов не предусмотрено.	Или по 10 ампул вместимостью 2 мл в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной. Одну контурную ячейковую упаковку вместе с инструкцией по применению и скарификатором ампульным вкладывают в пачку. Или по 5 ампул вместимостью 5 мл в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной. Две контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению и скарификатором ампульным в пачку. При использовании ампул с кольцом или точкой излома вложение скарификаторов не предусмотрено.

Генеральный директор
ООО «Экспертно-юридический центр
по лекарственным средствам и средствам
медицинского применения» Ивасько Ю.Г.