МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

ТИОТРИАЗОЛИН®,

морфолиний-метил-триазолил-тиоацетат

раствор для внутривенного и внутримышечного введения 25 мг/мл

ПАО «Галичфарм», Украина

Изменение № 3

Дата внесения Изменения «____» 140116 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Форма выпуска Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 25 мг/мл. По 2 мл или 4 мл в ампулы или в ампулы с кольцом излома красного цвета или в ампулы с точкой излома емкостью 2 мл или 5 мл соответственно. 10 ампул вместимостью 2 мл или 5 мл вместе с инструкцией по медицинскому применению и скарификатором ампульным вкладывают в коробку с	**Форма выпуска** Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 25 мг/мл. По 2 мл или 4 мл в ампулы стеклянные бесцветные 1 класса гидролитической устойчивости или в ампулы стеклянные бесцветные 1 класса гидролитической устойчивости с кольцом излома красного цвета или в ампулы стеклянные бесцветные 1 класса гидролитической устойчивости с точкой излома емкостью 2 мл или 5

Старая редакция	Новая редакция
гофрированным вкладышем. Коробку обклеивают этикеткой-бандероль. Или по 10 ампул вместимостью 2 мл в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной. Одну контурную ячейковую упаковку вместе с инструкцией по применению и скарификатором ампульным вкладывают в пачку. Или по 5 ампул вместимостью 5 мл в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной. Две контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению и скарификатором ампульным в пачку. При использовании ампул с кольцом или точкой излома вложение скарификаторов не предусмотрено.	мл соответственно. По 10 ампул вместимостью 2 мл в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной. Одну контурную ячейковую упаковку вместе с инструкцией по применению и скарификатором ампульным вкладывают в пачку. Или по 5 ампул вместимостью 5 мл в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной. Две контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению и скарификатором ампульным в пачку. При использовании ампул с кольцом или точкой излома вложение скарификаторов не предусмотрено.
Производитель АО «Галичфарм» Украина, 79024, г. Львов, ул. Опрышковская, 6/8. тел/факс: (38032) 294-99-94.	**Наименование и адрес юридического лица, на имя которого выдано регистрационное удостоверение** «ФАРМАЦЕУТИКАЛ БАЛКАНС»

Старая редакция	Новая редакция
	д.о.о. Нови Бечей, Куманачки пут бб, Нови Бечей, Республика Сербия **Производитель** ПАО «Галичфарм» Украина, 79024, г. Львов, ул. Опрышковская, 6/8. тел/факс: (8-10-38-032) 294-99-94. При упаковке препарата на «ФАРМАЦЕУТИКАЛ БАЛКАНС» д.о.о. Нови Бечей, Республика Сербия: Упаковано: «ФАРМАЦЕУТИКАЛ БАЛКАНС» д.о.о. Нови Бечей Куманачки пут бб, Нови Бечей, Республика Сербия Тел.: +381 23 775070 +381 23 775072
Претензии потребителей направлять по адресу: АО «Галичфарм» Украина, 79024, г. Львов, ул. Опрышковская, 6/8. тел/факс: (38032) 294-99-94.	**Организация, принимающая претензии потребителей:** Представительство Корпорации «АРТЕРИУМ» в Российской Федерации: Адрес: 109004, г. Москва,

Старая редакция	Новая редакция
	ул. Таганская, 3, офис 509-510. Тел. (495) 640 20 02

Генеральный директор

ООО «Экспертно-юридический центр» Ренев А.В.