ЛП-№(007938)-(РГ-RU) от 16.03.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 28.11.2024 № 26315
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Муравьиный спирт

Регистрационный номер:

Торговое наименование. Муравьиный спирт.

Международное непатентованное или группировочное наименование. Муравьиная кислота.

Лекарственная форма.
Раствор для наружного применения [спиртовой].

Состав на 100 г:

Действующее вещество:

Муравьиная кислота – 1,4 г

Вспомогательное вещество:

Этанол (этиловый спирт) 70 % – 98,6 г

Описание. Прозрачная бесцветная жидкость своеобразного резкого запаха.

Фармакотерапевтическая группа.
Препараты для наружного применения при мышечных и суставных болях; другие препараты для наружного применения при мышечных и суставных болях.

Код АТХ: M02AX10

Фармакологические свойства.
Фармакодинамика
Местнораздражающее средство, оказывает «отвлекающее» действие. Возбуждает чувствительные рецепторы кожи, вызывает расширение сосудов, улучшает трофику тканей.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 28.11.2024 № 26315
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

Фармакокинетика

Данные отсутствуют.

Показания к применению.

Муравьиный спирт показан к применению у взрослых в возрасте от 18 лет в составе комплексной терапии при невралгии, миалгии, артралгии в качестве отвлекающего средства.

Противопоказания.

Гиперчувствительность к муравьиной кислоте и к любому из вспомогательных веществ, нарушение целостности кожных покровов или воспалительные заболевания кожи в месте предполагаемого нанесения (в т.ч. дерматит, экзема), беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных).

Применение при беременности и в период грудного вскармливания.

Противопоказано.

Способ применения и дозы.

Наружно. Растирают кожу в болезненной области. Курс лечения продолжается в зависимости от лечебного эффекта, но не более 1-2 недель. При необходимости курс можно повторять.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие.

Гиперемия, зуд кожи, аллергические реакции.

Если любые из указанных побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка.

При случайном приеме препарата внутрь возможны: головокружение, головная боль, тошнота, рвота, гастралгия, нарушение функций сердечно-сосудистой системы,

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 28.11.2024 № 26315
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

стимуляция или угнетение центральной нервной системы, нарушение зрения, циркуляторный коллапс, шок, в том числе с летальным исходом.

Лечение: следует немедленно обратиться к врачу. Рекомендуется промывание желудка, прием активированного угля, при необходимости – симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами.

При одновременном применении с препаратами для наружного применения, которые содержат органические соединения, могут образоваться новые соединения и наблюдаться денатурация белковых компонентов.

Особые указания.

Следует избегать попадания препарата в глаза, на слизистые оболочки и на мокнущие раны. При попадании препарата в глаза следует тщательно промыть их большим количеством воды. После нанесения необходимо вымыть руки.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска.

Раствор для наружного применения [спиртовой] 1,4 %.

По 30, 50, 80, 100 мл во флаконы оранжевого стекла с винтовой горловиной, укупоренные полиэтиленовыми пробками и крышками навинчиваемыми. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. Допускается полный текст инструкции по применению наносить на пачку. Флаконы без пачки вместе с равным количеством инструкций по применению помещают в групповую упаковку. По 1 л в бутыли стеклянные с винтовой горловиной, укупоренные пробками и крышками навинчиваемыми (для стационаров). Каждую бутыль с инструкцией по применению помещают в ящик из гофрированного картона или пластиковую (деревянную) обрешетку.

По 5, 10, 20 л в канистры полиэтиленовые (для стационаров) с инструкциями по применению.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 28.11.2024 № 26315
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

Условия хранения.

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в местах, недоступных для детей.

Срок годности.

3 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска.

Отпускают без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения / Производитель / Организация, принимающая претензии:

АО «Ивановская фармацевтическая фабрика», Россия

153007, Ивановская обл., г.о. Иваново, г. Иваново, ул. Генерала Горбатова, д. 19А

Тел.: 8 (493) 233-42-73

e-mail: ivff@yandex.ru