МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного препарата

МУРАВЬИНЫЙ СПИРТ

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Муравьиный спирт

Международное непатентованное или группировочное наименование: Муравьиная кислота

Лекарственная форма: Спрей для наружного применения спиртовой

Состав:

Действующее вещество: муравьиная кислота 14,0 г.

Вспомогательные вещества: этанол (спирт этиловый 95 %) – 662,8 г; вода очищенная - 323,2 г.

Описание

Прозрачная бесцветная жидкость с характерным резким запахом.

МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП-005465-110419
СОГЛАСОВАНО

Фармакотерапевтическая группа

Местнораздражающее средство.

Код АТХ: M02AX10

Фармакологические свойства

Муравьиный спирт обладает местнораздражающим действием, расширяет сосуды, улучшает кровоснабжение тканей, уменьшает воспаление и боль.

Показания к применению

В составе комплексной терапии при невралгии, миалгии, артралгии в качестве отвлекающего средства.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата, нарушение целостности кожных покровов или воспалительные заболевания кожи в месте предполагаемого нанесения (в т.ч. дерматит, экзема). Беременность, период лактации, детский возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных).

Показания при беременности и в период лактации

Противопоказано.

Способ применения и дозы

Наружно. Наносят распылением и растирают кожу в болезненной области. Курс лечения продолжается в зависимости от лечебного эффекта, но не более 1-2 недель. При необходимости курс можно повторять. Если после лечения улучшения не наступает или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. В случае

необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата.

Побочное действие

Гиперемия, зуд кожи, аллергические реакции. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

При применении препарата в соответствии с инструкцией по применению передозировка маловероятна. При случайном приеме внутрь возможны: головокружение, головная боль, тошнота, рвота, гастралгия, нарушения функций сердечнососудистой системы, стимуляция или угнетение центральной нервной системы, нарушение зрения, циркуляторный коллапс, шок, в том числе с летальным исходом.

Лечение: следует немедленно обратиться к врачу. Рекомендуется промывание желудка, прием активированного угля, при необходимости – симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

При одновременном применении с препаратами для наружного применения, которые содержат органические соединения, могут образовываться новые соединения и наблюдаться денатурация белковых соединений.

Особые указания

Не допускать попадание препарата на слизистые оболочки, раны. Не распылять в глаза. При попадании препарата в глаза, следует тщательно промыть их обильно водой. После нанесения препарата необходимо вымыть руки.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат не влияет на способность управлять транспортом или заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Спрей для наружного применения спиртовой 1,4%.

По 40 мл, 50 мл во флаконы из полиэтилена высокой плотности (ПЭВП) с винтовой горловиной укупоренные навинчиваемыми пластмассовыми кнопочными распылителями для флаконов.

По 40 мл, 50 мл во флаконы из полиэтилентерефталата (ПЭТФ) с винтовой горловиной укупоренные навинчиваемыми пластмассовыми кнопочными насосами-распылителями для флаконов.

По 50 мл во флаконы-капельницы стеклянные с винтовой горловиной укупоренные навинчиваемыми пластмассовыми кнопочными насосами-распылителями для флаконов.

По 40 мл, 50 мл во флаконы оранжевого или коричневого стекла с винтовой горловиной укупоренные навинчиваемыми пластмассовыми кнопочными распылителями для флаконов.

По 40 мл, 50 мл во флаконы оранжевого стекла с винтовой горловиной укупоренные пробками и/или крышками навинчиваемыми пластмассовыми.

На каждый флакон наклеивают этикетку из бумаги этикеточной или писчей или этикетку самоклеющуюся.

Каждый флакон ПЭВП, флакон ПЭТФ, флакон-капельницу, флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению, помещают в пачку из картона.

Каждый флакон укупоренный пробкой и/или крышкой комплектуют навинчиваемым пластмассовым кнопочным распылителем для флаконов и вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Допускается наносить полный текст инструкции по медицинскому применению на пачку вместо инструкции, вкладываемой в пачку.

Срок годности

3 года. Не применять после истечения срока годности.

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 ^{0}С.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Предприятие-производитель/организация, принимающая претензии

ЗАО “ЭКОлаб”, 142530, Московская обл., г. Электрогорск, ул. Буденного, д. 1.

Тел. (49643) 3-26-49 – отд. продаж, 3-37-30 – ОБТК, 3-34-05 - факс.

Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб» В.Ю. Борисов