ИНСТРУКЦИЯ
(информация для потребителей)
по медицинскому применению препарата
ИНГАЛИПТ

Регистрационный номер:
Торговое название: Ингалипт
Мнн: нет
Лекарственная форма: спрей для местного применения
Состав: в 100 мл препарата содержится:
Активные вещества: сульфаниламид (стрептоцид) 2,5 мг, сульфатиазол 2,5 г, эвкалипта листьев масло 0,05 мг, мяты перечной листьев масло 0,05 мг, тимол 0,05 мг,
Вспомогательные вещества: глицерол 7,0 г, сахароза (сахар-рафинад) 5,0 г, полисорбат-80 (твин-80) 3,0 г, этанол 95% 6,0 г, вода до 100 мл.
Описание: прозрачная жидкость от светло-желтого до темно-желтого цвета с характерным запахом.
Фармакотерапевтическая группа: противомикробное комбинированное средство.
Код АТХ: R02AA20
Фармакологические свойства: комбинированный препарат для местного применения. *Фармакодинамика:* Входящие в состав препарата растворимые сульфаниламиды оказывают противомикробное действие в отношение грамположительных и грамотрицательных бактерий, вызывающих заболевания полости рта и глотки. Тимол, эвкалиптовое масло и мяты перечной листьев масло оказывают противогрибковый (в отношении грибов рода Candida), противомикробный, противовоспалительный и лёгкий обезболивающий эффект.
Фармакокинетика: препарат образует терапевтическую концентрацию главным образом в очаге воспаления. Частично всасываются сульфаниламидные препараты: сульфаниламид и сульфатиазол. Оба препарата связываются с белками крови: сульфаниламид натрия на 12-14%, сульфатиазол натрия на 55%. В процессе биотрансформации образуются ацетилированные формы препаратов, в виде которых они выводятся почками. Период полувыведения стрептоцида составляет 10 час. , норсульфазола-натрия –1,2 час.
Показания к применению.
Острые и хронические инфекционно-воспалительные заболевания полости рта, гортани и носоглотки: тонзиллит, фарингит, афтозный и язвенный стоматит.
Противопоказания.
Индивидуальная непереносимость сульфаниламидов, эфирных масел или других компонентов препарата.

Способ применения и дозы.
Перед орошением рот и глотку прополаскивают теплой кипяченной водой. С пораженных участков полости рта (язвы, эрозии) с помощью тампонов удаляют некротический налет.
Устанавливают насадку под углом 90° к флакону. Конец насадки вводят в полость рта и нажимают на головку клапана микродозатора 3-4 раза, направляя поток жидкости на обрабатываемые участки. Орошение производят 4-5 раз в сутки через 2-3 часа.
Во избежание засорения распылителя рекомендуется после применения продуть его, либо промыть кипяченной водой.

Побочное действие.
Возможны индивидуальная непереносимость и аллергические реакции на компоненты препарата, кратковременное ощущение жжения или першения.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами.
Системные эффекты при использовании данного препарата по назначению маловероятны, что позволяет одновременно применять другие лекарственные средства без опасности их взаимодействия с компонентами препарата.

Форма выпуска.
Спрей для местного применения (флаконы-спреи полиэтиленовые) по 25, 30, 50 мл.
По 1 флакону-спрею, вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Срок годности.
1 год.
Не использовать после срока, указанного на упаковке.

Условия хранения.
Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от 8° до 15° С, в недоступном для детей месте.

Условия отпуска из аптек.
Без рецепта.

Производитель:
ООО «ДАВ Фарм», Россия
115184, Москва, Большая Татарская д. 35, стр. 1
Тел. (095) 627-11-20; 627-11-21
Претензии по качеству предъявлять по адресу (тел.), указанному выше.

И.о. директора ИДКЭЛС А.Н.Васильев

Ген. директор ООО «ДАВ Фарм» А.Г.Саакян