МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛСР-000073-070416
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Ингалипт

наименование лекарственного препарата

спрей для местного применения

лекарственная форма, дозировка

ООО «ДАВ Фарм», Россия

наименование производителя, страна

Изменение № 2

Дата внесения Изменения «____» 070416 20__ г.

Регистрационный номер: **ЛСР 000073-220507**

Старая редакция	Новая редакция
Мнн: нет	**Международное непатентованное или группировочное наименование:** Мяты перечной листьев масло + Месульфамид + Сульфатиазол + Тимол + Эвкалипта прутовидного листьев масло
Состав: в 100 мл препарата содержится: *Активные вещества:* сульфаниламид (стрептоцид) 2,5 г, сульфатиазол 2,5 г, эвкалипта листьев масло 0,05 г, мяты перечной листьев масло 0,05 г, тимол 0,05 г. *Вспомогательные вещества:* глицерол 7,0 г, сахароза (сахар-	**Состав:** в 100 мл препарата содержится: *Активные компоненты:* Стрептоцида растворимого 2,5 г, сульфатиазола натрия 2,5 г, тимола 0,05 г, эвкалиптового масла 0,05 г, мяты перечной масла 0,05 г. *Вспомогательные вещества:* Этилового спирта 95%

рафинад) 5,0 г, полисорбат-80 (твин-80) 3,0 г, этанол 95% 6,0 г, вода до 100 мл.	(этанол) 6,0 г, сахара белого (сахарозы) 5,0 г, глицерина (глицерол) 7,0 г, твина-80 (полисорбат-80) 3,0 г, воды очищенной до 100 мл.
Фармакологические свойства: комбинированный препарат для местного применения. *Фармакодинамика:* Входящие в состав препарата растворимые сульфаниламиды оказывают противомикробное действие в отношение грамположительных и грамотрицательных бактерий, вызывающих заболевания полости рта и глотки. Тимол, эвкалиптовое масло и мяты перечной листьев масло оказывают противогрибковый (в отношении грибов рода Candida), противомикробный, противовоспалительный и лёгкий обезболивающий эффект. *Фармакокинетика:* препарат образует терапевтическую концентрацию главным образом в очаге воспаления. Частично всасываются сульфаниламидные препараты: сульфаниламид и сульфатиазол. Оба	**Фармакологические свойства**: комбинированный препарат для местного применения. *Фармакодинамика:* Входящие в состав препарата растворимые сульфаниламиды оказывают противомикробное действие в отношение грамположительных и грамотрицательных бактерий, вызывающих заболевания полости рта и глотки. Тимол, эвкалиптовое масло и мяты перечной листьев масло оказывают противогрибковый (в отношении грибов рода Candida), противомикробный, противовоспалительный и лёгкий обезболивающий эффект. *Фармакокинетика:* препарат образует терапевтическую концентрацию главным образом в очаге воспаления. Частично всасываются сульфаниламидные препараты: сульфаниламид и

препарата связываются с белками крови: сульфаниламид натрия на 12-14%, сульфатиазол натрия на 55%. В процессе биотрансформации образуются ацетилированные формы препаратов, в виде которых они выводятся почками. Период полувыведения стрептоцида составляет 10 час, норсульфазола-натрия -1,2 час.	сульфатиазол. Оба препарата связываются с белками крови: сульфаниламид натрия на 12-14%, сульфатиазол натрия на 55%. В процессе биотрансформации образуются ацетилированные формы препаратов, в виде которых они выводятся почками. Период полувыведения стрептоцида растворимого составляет 10 час, сульфатиазола натрия -1,2 час.
Противопоказания: Индивидуальная непереносимость сульфаниламидов, эфирных масел или других компонентов препарата.	**Противопоказания:** Индивидуальная непереносимость сульфаниламидов, эфирных масел или других компонентов препарата. Детский возраст до 3-х лет.
Раздел отсутствует	**Применение при беременности и в период грудного вскармливания:** Применение при беременности и в период грудного вскармливания возможно по рекомендации врача, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.
Раздел отсутствует	**Передозировка:**

	Симптомы: тошнота, рвота, связанные с заглатыванием части препарата. *Лечение:* специфический антидот отсутствует, симптоматическая и поддерживающая терапия.
Раздел отсутствует	**Особые указания:** Применение препарата Ингалипт у детей старше 3-х лет возможно только по рекомендации врача. Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).
Производитель: ООО «ДАВ Фарм», Россия, 115184, Москва, Большая Татарская д. 35, стр. 1 Тел. (495) 627-11 -20; 627-11-21 Претензии по качеству предъявлять по адресу (тел.), указанному выше.	**Предприятие-производитель:** ООО «ДАВ Фарм» Адрес: Россия, 143079, Московская область, Одинцовский район, поселок Старый городок, ул. Заводская д. 20, стр. 1 Тел. (495) 627-11 -20.

	Организация, принимающая претензии: ООО «ДАВ Фарм» Адрес юридический: Россия, 115184, Москва, Большая Татарская д. 35, стр. 1 Тел./факс (495) 627-11-21.

Генеральный директор
ООО «ДАВ Фарм»

подпись

Саакян А. Т.