МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ИНГАЛИПТ-Н

Внимательно прочитайте эту инструкцию перед тем, как начать применение этого препарата, так как она содержит важную для Вас информацию.

Сохраняйте инструкцию, она может понадобиться вновь.

Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к врачу.

Лекарственное средство, которым Вы лечитесь, предназначено лично для Вас, и его не следует передавать другим лицам, поскольку оно может причинить им вред даже при наличии таких же симптомов, что и у Вас.

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Ингалипт-Н

Международное непатентованное наименование или группировочное наименование: Мяты перечной листьев масло + Месульфамид + Сульфатиазол + Тимол + Эвкалипта прутовидного листьев масло

Лекарственная форма: спрей для местного применения

Состав на один баллон:

Действующие вещества: месульфамид натрия (стрептоцид растворимый) – 0,750 г, сульфатиазол натрия (сульфатиазол натрия гексагидрат) – 0,750 г, тимол - 0,015 г, эвкалипта прутовидного листьев масло - 0,015 г, мяты перечной листьев масло - 0,015 г.

Вспомогательные вещества: этанол 96 % - 1,800 г, сахароза - 1,500 г, глицерол - 2,100 г, полисорбат-80 - 0,900 г, вода очищенная - до 30,00 г.

Описание: прозрачная жидкость от светло-желтого до темно-желтого цвета с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа: противомикробное комбинированное средство.

Код АТХ: R02AA20.

105084

Фармакологическое действие

Комбинированный препарат для местного применения при инфекционно-воспалительных заболеваниях полости рта и горла. Входящие в состав препарата растворимые сульфаниламиды оказывают противомикробное действие (в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, вызывающих заболевания полости рта). Тимол, эвкалиптовое масло и мяты перечной масло оказывают противогрибковый (в отношении грибов рода Candida), противомикробный, противовоспалительный и легкий обезболивающий эффект.

Показания к применению

Острые и хронические инфекционно-воспалительные заболевания полости рта, гортани и носоглотки: ларингит, фарингит, тонзиллит, афтозный и язвенный стоматит.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость сульфаниламидов, эфирных масел или других компонентов препарата, детский возраст, беременность, период грудного вскармливания.

Применение во время беременности и в период грудного вскармливания

Противопоказано применение препарата Ингалипт-Н при беременности и в период грудного вскармливания. В состав препарата входят сульфаниламиды, которые проникают через плаценту и обнаруживаются в крови плода. Возможно развитие тератогенного действия. При необходимости применения препарата в период грудного вскармливания следует прекратить грудное вскармливание, т. к. сульфаниламиды проникают в грудное молоко и могут вызвать ядерную желтуху у новорожденных.

Способ применения и дозы

Местно. Перед орошением рот и глотку прополаскивают теплой, кипяченой водой. С пораженных участков полости рта (язвы, эрозии) с помощью тампона удаляют некротический налет. Снять с баллона предохранительный колпачок, на стержень клапана надеть прилагаемый распылитель. Свободный конец распылителя ввести в рот и нажать на головку баллона, в течение 1-2 сек. При заболеваниях полости рта препарат удерживают в полости рта 5-7 мин. Во избежание снижения эффективности препарата рекомендуется воздерживаться от приема пищи и жидкости в течение 30 мин после орошения. Орошение производят 3-4 раза в сутки. Курс лечения не более 7 дней.

105084

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

Возможно кратковременное ощущение «жжения» или «першения», аллергические реакции.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Случаи передозировки не описаны.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Вследствие низкой системной абсорбции препарата, при применении в соответствии с инструкцией по применению, взаимодействие с другими лекарственными средствами маловероятно, что позволяет применять одновременно другие препараты без опасности их взаимодействия с компонентами препарата.

Особые указания

Препарат Ингалипт-Н, спрей для местного применения содержит этанол 96 % (1,800 г/30 мл).

Препарат Ингалипт-Н, спрей для местного применения содержит сахарозу (1,500 г/30 мл), что необходимо учитывать пациентам с сахарным диабетом.

Во избежание закупорки отверстия распылителя по окончании манипуляции его необходимо продуть или поместить в стакан с чистой водой.

При использовании баллон следует держать только вертикально!

Баллон не вскрывать, беречь от детей, хранить вдали от отопительной системы, предохранять от падений, ударов и воздействия прямых солнечных лучей.

105084

Влияние на способность управлять автотранспортом и работать с механизмами

Ингалипт-Н не влияет на способность к вождению автотранспорта и выполнению работ, требующих повышенной скорости психомоторных реакций.

Форма выпуска

Спрей для местного применения.

По 30 г в баллоны аэрозольные моноблочные алюминиевые с внутренним фенольно-эпоксидным защитным покрытием с механическими насосами в комплекте с насадками горловыми (распылителями) с предохранительными колпачками.

На баллон наклеивают липкую этикетку, на которую нанесен текст краской для трафаретной печати.

Каждый баллон с насадкой горловой (распылителем) и предохранительным колпачком и инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Срок годности

2 года. Не использовать после истечения срока годности.

Условия хранения

Хранить при температуре от 3 ^{0}C до 35 ^{0}C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

МЗ РФ
ФГБУ
ЭКСПЕРТНЫЙ ОТЧЕТ
ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДЛЯ ДАННОЙ
ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
НЦЭСМП

Владелец регистрационного удостоверения:

ООО «Микрофарм»

61013, Украина, г. Харьков, ул. Шевченко, 20

Производитель/Организация, принимающая претензии потребителей:

ООО «Микрофарм»

Юридический адрес: 61013, Украина, г. Харьков, ул. Шевченко, 20.

Адрес для переписки (фактический адрес): 61013, Украина, г. Харьков, ул. Шевченко, 20.

Тел./факс: (+38-057) 71-42-422, (+38-057) 71-42-080

Генеральный директор

ООО «АЛВИЛС» Ионов А. Г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * ГР.№1600044 * МОСКВА *
"АЛВИЛС"

105084