ЛП-№(012494)-(РГ-RU) от 18.11.2025

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 12.11.2025 № 28221
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ИНГАЛИПТ

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Ингалипт

Международное непатентованное или группировочное наименование: мяты перечной листьев масло + сульфаниламид + сульфатиазол + тимол + эвкалипта листьев масло

Лекарственная форма: аэрозоль для местного применения

Состав:

1 баллон содержит:	15 мл	30 мл
Действующие вещества:		
Сульфаниламид натрия (месульфамид, стрептоцид растворимый)	375,0 мг	750,0 мг
Сульфатиазола натрия пентагидрат в пересчете на сульфатиазол натрия безводный	375,0 мг 281,0 мг	750,0 мг 563,0 мг
Тимол	7,5 мг	15,0 мг
Эвкалипта листьев масло	7,5 мг	15,0 мг
Мяты перечной листьев масло	7,5 мг	15,0 мг
Вспомогательные вещества:		
Этанол (спирт этиловый) 95 % / 96 % (в пересчете на безводный)	833,0 мг	1666,0 мг
Сахароза (сахар)	750,0 мг	1500,0 мг
Глицерол (глицерин)	1050,0 мг	2100,0 мг
Полисорбат-80 (твин-80)	450,0 мг	900,0 мг
Вода очищенная	до 15 мл	до 30 мл
Азот	от 150 до 200 мг	от 300 до 400 мг

Описание: раствор от светло-желтого до темно-желтого цвета с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа: препараты для лечения заболеваний горла; антисептики

Код АТХ: R02AA20

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 12.11.2025 № 28221
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Комбинированный препарат для местного применения. Входящие в состав препарата растворимые сульфаниламиды оказывают противомикробное действие (в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, вызывающих заболевания полости рта и глотки). Тимол, эвкалипта листьев масло и мяты перечной листьев масло оказывают противогрибковый (в отношении грибов рода *Candida*), противомикробный, противовоспалительный и легкий обезболивающий эффект.

Фармакокинетика

Абсорбция

Препарат образует терапевтическую концентрацию, главным образом, в очаге воспаления. Частично всасываются сульфаниламидные препараты, которые связываются с белками крови: стрептоцид растворимый на 12-14 %, сульфатиазол натрия на 55 %.

Биотрансформация

В процессе биотрансформации образуются ацетилированные формы препаратов, в виде которых они выводятся почками.

Элиминация

Период полувыведения стрептоцида составляет 10 ч, сульфатиазола натрия – 1-2 ч.

Показания к применению

Тонзиллит, фарингит, ларингит, афтозный и язвенный стоматит.

Противопоказания

- Гиперчувствительность к любому из компонентов препарата.
- Беременность.
- Период грудного вскармливания.
- Детский возраст (до 3 лет).
- Дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Беременность

Противопоказано применение препарата Ингалипт при беременности. В состав препарата входят сульфаниламиды, которые проникают через плаценту и обнаруживаются в крови плода. Возможно развитие тератогенного действия.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 12.11.2025 № 28221
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Период грудного вскармливания

Противопоказано применение препарата Ингалипт в период грудного вскармливания.

При необходимости использования препарата в период грудного вскармливания необходимо прекратить грудное вскармливание, так как сульфаниламиды проникают в грудное молоко и могут вызвать ядерную желтуху у новорожденных.

Способ применения и дозы

Местно. Сняв предохранительный колпачок с баллона и надев прилагаемый распылитель, распыляют взвесь в полость рта в течение 1-2 секунды. Препарат удерживают в полости рта 5-7 минут. Орошение проводится 3-4 раза в сутки с предварительным прополаскиванием рта кипяченой водой.

Если после лечения улучшения не наступает или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Применяйте препарат только согласно тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

В случае необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата.

Во избежание снижения эффективности препарата рекомендуется воздерживаться от приема пищи и жидкости в течение 30 мин после орошения.

Курс лечения не более 7 дней.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции (высыпания на коже, зуд), кратковременное ощущение жжения или першения в горле.

При проявлении нежелательных реакций необходимо отменить применение препарата и обратиться к врачу.

Если у Вас отмечаются нежелательные реакции, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие нежелательные реакции, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Симптомы

Тошнота, рвота, связанные с заглатыванием части препарата.

Лечение

Специфический антидот отсутствует, симптоматическая и поддерживающая терапия.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 12.11.2025 № 28221
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Совместим с другими лекарственными средствами, данные о клинически значимых взаимодействиях отсутствуют.

Возможно одновременное применение с другими местными противомикробными средствами с целью расширения спектра действия и повышения эффективности.

Особые указания

Применение препарата Ингалипт у детей возможно по решению врача.

Баллон не вскрывать и не нагревать. Предохранять от падений, ударов, воздействия прямых солнечных лучей.

Вспомогательные вещества

Этанол

Данный лекарственный препарат содержит этанол (спирт этиловый) 95 % (0,8 г/15 мл, 1,7 г/30 мл). Количество в 0,8 г/15 мл данного лекарственного препарата эквивалентно менее чем 20 мл пива или 8 мл вина, а количество в 1,7 г/30 мл эквивалентно менее чем 42,5 мл пива или 17 мл вина. Небольшое количество спирта в данном лекарственном препарате не будет оказывать заметного действия.

Сахароза

Данный лекарственный препарат содержит сахарозу. Пациентам с редко встречающейся наследственной непереносимостью фруктозы, глюкозо-галактозной мальабсорбцией или дефицитом сахаразы/изомальтазы не следует принимать данный лекарственный препарат.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Ингалипт не оказывает влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

Форма выпуска

Аэрозоль для местного применения.

По 15, 30 мл в баллоне аэрозольном из алюминия, с клапаном непрерывного действия, с колпачком и распылительной насадкой.

Баллон маркируют методом печати краской или наклеивают этикетку.

Каждый баллон с распылителем и инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 12.11.2025 № 28221
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

При температуре не выше 30 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Баллон не вскрывать. Хранить вдали от источника огня, отопительной системы и прямых солнечных лучей. Предохранять от падений и ударов.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения

ОАО «Мосхимфармпрепараты» им. Н.А. Семашко»

115172, г. Москва, ул. Большие Каменщики, д. 9

тел./факс: (495) 912-71-61

Производитель

АО «Кировская фармацевтическая фабрика»

Россия, 610000, Кировская обл., г. Киров, ул. Московская, д. 27 а

Организация, принимающая претензии потребителей

АО «Кировская фармацевтическая фабрика»

Россия, 610000, Кировская обл., г. Киров, ул. Московская, д. 27 а

Тел. (8332) 22-01-26

E-mail: kachestvo-s@k-ff.ru