



ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Гевискон® форте

наименование лекарственного препарата

суспензия для приема внутрь [мятная], [анисовая]

лекарственная форма, дозировка

Рекитт Бенкизер Хелскэр (Великобритания) Лимитед, Великобритания

наименование производителя, страна

Изменение № 1

Дата внесения Изменения « ____ » 14 05 19 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
Передозировка <i>Симптомы:</i> может отмечаться вздутие живота. <i>Лечение:</i> симптоматическое.	Передозировка <i>Симптомы</i> Симптомы в большинстве случаев являются незначительными; может возникнуть некоторый дискомфорт в области живота, ощущение вздутия. <i>Лечение</i> При передозировке показано симптоматическое лечение.
Особые указания В 10 мл суспензии содержание натрия составляет 106 мг (4,6 ммоль). Это следует учитывать при необходимости соблюдения диеты с ограниченным содержанием соли, например, при застойной сердечной недостаточности и почечной недостаточности легкой степени тяжести. В 10 мл суспензии содержание калия составляет 78 мг (2,0 ммоль). Необходимо	Особые указания Натрий: Гевискон® форте является препаратом с высоким содержанием натрия. В 10 мл суспензии содержание натрия составляет 106 мг (4,6 ммоль), что эквивалентно 5,3% рекомендованного ВОЗ максимального ежедневного потребления натрия. Максимальная суточная доза суспензии (40 мл) эквивалентна 21% от рекомендованного ВОЗ максимального

Старая редакция	Новая редакция
проявлять осторожность при лечении пациентов с почечной недостаточностью легкой степени тяжести, при необходимости соблюдения диеты с ограниченным содержанием калия и при приеме лекарственных средств, которые могут увеличивать уровень калия в плазме крови. В 10 мл суспензии содержание кальция карбоната составляет 200 мг (2,0 ммоль). Препарат следует с осторожностью принимать пациентам с гиперкальциемией, нефрокальцинозом и мочекаменной болезнью с образованием кальций-оксалатных камней. Препарат содержит метилпарагидроксибензоат и пропилпарагидроксибензоат, поэтому может вызывать аллергические реакции (в том числе отсроченные).	ежедневного потребления натрия. Это следует учитывать при необходимости соблюдения диеты с ограниченным содержанием соли, например, при застойной сердечной недостаточности и почечной недостаточности. Калий: В 10 мл суспензии содержание калия составляет 78 мг (2,0 ммоль). Пациенты, соблюдающие строгую калиевую диету, или пациенты с почечной недостаточностью должны учитывать это количество. Кальций: В 10 мл суспензии содержание кальция карбоната составляет 200 мг (2,0 ммоль). Препарат следует с осторожностью принимать пациентам с гиперкальциемией, нефрокальцинозом и мочекаменной болезнью с образованием кальций-оксалатных камней. Препарат содержит метилпарагидроксибензоат и пропилпарагидроксибензоат, поэтому может вызывать аллергические реакции (в том числе отсроченные).

Менеджер по регистрации

ООО «Рекитт Бенкизер Хэлскэр»

Кононенко М.Е.

