

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА**

НАТРИЯ ГИДРОКАРБОНАТ

Регистрационный номер

Торговое наименование

Натрия гидрокарбонат

Международное непатентованное или группировочное наименование

Натрия гидрокарбонат

Лекарственная форма

Порошок для приготовления раствора для приема внутрь и местного применения

Состав

1 г препарата содержит:

Натрия гидрокарбоната – 1 г

Описание

Белый кристаллический порошок без запаха. Устойчив в сухом воздухе, медленно разлагается во влажном.

Фармакотерапевтическая группа

Кровезаменители и перфузионные растворы; ирригационные растворы; солевые растворы.

Код АТХ B05CB04

Фармакологические свойства

Натрия гидрокарбонат – вещество, обладающее антацидным действием, антацидный эффект быстрый, но кратковременный. Образующийся в результате реакции нейтрализации CO_2 раздражает рецепторы слизистой оболочки желудка, усиливает выделение гастрина с вторичной активацией секреции, может вызывать неприятные ощущения в желудке (вследствие его растяжения) и отрыжку.

Всасываясь, приводит к развитию алкалоза. Ощелачивание мочи предупреждает осаждение мочевой кислоты в мочевыводящих путях.

Увеличивает выведение Na^+ и Cl^- , осмотический диурез; сдвигая в щелочную сторону реакцию бронхиальной слизи, повышает бронхиальную секрецию, снижает вязкость мокроты и улучшает ее отхаркивание.

При местном применении оказывает противовоспалительное действие.

Показания к применению

Лекарственный препарат Натрия гидрокарбонат показан к применению у взрослых и детей для эпизодического кратковременного купирования приступов изжоги; для разжижения бронхиального секрета; при воспалительных заболеваниях полости рта.

Противопоказания

- гиперчувствительность к натрия гидрокарбонату;

- метаболический алкалоз;
- беременность, период грудного вскармливания.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Взрослые: 1 чайную ложку порошка без верха (около 5 г) растворить в 1/2 стакана теплой питьевой воды (100 мл). Принимать внутрь по 2-4 чайные ложки раствора 4 – 6 раз в сутки.

Дети: 1 чайную ложку порошка без верха (около 5 г) растворить в 1 стакане теплой питьевой воды (200 мл). Принимать детям в возрасте от 1 месяца до 1 года по 1 чайной ложке раствора (5 мл) до 3 раз в сутки. В возрасте от 1 года до 3 лет по 2 чайной ложки раствора (10 мл) до 4 раз в сутки. В возрасте от 3 до 7 лет по 1 столовой ложке (15 мл) до 5 раз в сутки. В возрасте от 7 до 12 лет по 1,5 столовые ложки (около 20 мл) 4-6 раз в день. В возрасте от 12 до 18 лет по 2 столовые ложки (30 мл) 4-6 раз в день.

Местно: для полосканий, промываний и ингаляций применяют 0,5 - 2 % растворы натрия гидрокарбоната. Для приготовления 0,5 % раствора 1 чайную ложку порошка без верха (около 5 г) растворяют в 1 литре теплой питьевой воды. Для приготовления 1 % раствора 1 чайную ложку порошка без верха (около 5 г) растворяют в 500 мл теплой питьевой воды. Для приготовления 2 % раствора 1 чайную ложку порошка без верха (около 5 г) растворяют в 250 мл теплой питьевой воды. Для нейтрализации кислот на коже и слизистых применяют 2 % раствор.

Побочное действие

При длительном применении может развиваться алкалоз: снижение аппетита, отрыжка, тошнота, рвота, тревожность, головная боль, боль в животе, тетанические судороги, повышение артериального давления. В этих случаях следует отказаться от применения препарата.

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Не изучалось.

Особые указания

Не рекомендуется систематический прием из-за возможности защелачивания мочи и повышения риска образования фосфатных камней.

Сдвиг кислотно-основного состояния в щелочную сторону при кратковременном приеме не сопровождается клиническими симптомами, однако при хронической почечной недостаточности может значительно ухудшать состояние. Рвота, часто сопровождающая язвенную болезнь (потеря Cl^-), способна усиливать выраженность алкалоза. Интенсивное выделение CO_2 может спровоцировать перфорацию стенок желудочно-кишечного тракта.

У больных с сопутствующими заболеваниями сердца или почек избыточное употребление Na^+ вызывает отеки и сердечную недостаточность.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами

Применение препарата в соответствии с инструкцией не влияет на управление

транспортными средствами и механизмами, внимания и быстроты психомоторных реакций.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 18.07.2025 № 17973
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Форма выпуска

Порошок для приготовления раствора для приема внутрь и местного применения. По 10 г, 20 г, 30 г, 50 г или 100 г в пакеты термосвариваемые из материала комбинированного с полиэтиленовым покрытием или из бумаги металлизированной алюминиевой фольгой с полиэтиленовым покрытием или другого термосвариваемого влагонепроницаемого комбинированного материала;

или по 20 г, 25 г или 30 г в банки оранжевого стекла с треугольным венчиком типа БДС, укупоренные крышками натягиваемыми с уплотняющими элементами;

или по 10 г, 20 г, 30 г, 50 г или 100 г во флаконы из полиэтилена высокой или низкой плотности с дозирующим колпачком и крышкой из полиэтилена высокой или низкой плотности.

Каждую банку/флакон вместе с инструкцией по применению или 1, 2, 3, 5, 10 пакетов с инструкциями по применению помещают в пачку картонную.

Условия хранения

В сухом месте при температуре не выше 30 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

5 лет.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения

ООО «ДАНСОН-РУ»

Россия, 142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Комсомольская, д.1, стр.49, пом.1, ком.220;

Тел.: +7 (495) 580-30-60

Производитель/Организация принимающая претензии от потребителей

Закрытое акционерное общество «Ярославская фармацевтическая фабрика»

Российская Федерация, 150030, Ярославская область, г. Ярославль, ул. 1-я Путевая, д. 5;

Тел.: (4852) 44-38-56

e-mail: farmfab@yaroslavl.ru

Директор ЗАО «ЯФФ»



Юдина Е.В.