ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
МИКРОЛАКС® / MICROLAX®

Регистрационный номер: П № 011146/01.
Торговое название препарата: МИКРОЛАКС® (MICROLAX®).
Международное непатентованное название: -
Лекарственная форма: раствор для ректального введения.

Состав 1 мл раствора:
Активные компоненты:
Натрия цитрат – 90 мг, натрия лаурилсульфоацетат 70% – 12,9 мг (соответствует 9 мг натрия лаурилсульфоацетата), раствор сорбита 70% – 893 мг (соответствует 625 мг сорбита).
Вспомогательные компоненты:
Кислота сорбиновая, глицерин, вода.

Описание: бесцветная, опалесцирующая вязкая жидкость.
Фармакотерапевтическая группа: слабительное средство.
Код АТХ: A06AG11.

Фармакологические свойства
МИКРОЛАКС® - комбинированный препарат, оказывающий слабительное действие. Эффект наступает через 5 – 15 мин. В состав препарата входят натрия цитрат (пептизатор, который вытесняет связанную воду, содержащуюся в каловых массах), натрия лаурилсульфоацетат (разжижает содержимое кишечника) и сорбит (усиливает слабительное действие путем стимуляции поступления воды в кишечник). Увеличение количества воды за счет пептизации и разжижения способствует размягчению каловых масс и облегчает опорожнение кишечника.

Показания к применению:
Запор, в т.ч. с энкопрезом, подготовка к эндоскопическому (ректоскопия) и рентгенологическому исследованию желудочно-кишечного тракта.

Противопоказания:
Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и лактации:
Специальных мер предосторожности не требуется.

Способ применения и дозы:
Взрослые и дети старше 3 лет – вводить содержимое одной микроклизмы (5 мл) ректально, вставляя наконечник на всю длину.
Новорожденные и дети до 3-х лет – вводить наконечник на половину длины (см. отметку на наконечнике).
Если жалобы сохраняются в течение длительного времени, необходимо обратиться к врачу.

Указания по применению:
Отломите пломбу на наконечнике тюбика.
Слегка надавите на тюбик так, чтобы капля препарата смазала кончик клизмы. Это облегчит процесс введения.

Копия верна

Введите наконечник клизмы целиком (детям до 3-х лет - на половину длины) в прямую кишку.
Сдавливая тюбик, выдавите полностью его содержимое.
Извлеките наконечник, по-прежнему слегка сдавливая тюбик.

Побочные эффекты:
Легкое ощущение жжения в ректальной области; отдельные случаи повышенной чувствительности.

Передозировка:
Не описана.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:
Не описано.

Форма выпуска:
Раствор для ректального введения 5 мл в микроклизме для однократного применения (полиэтиленовый тюбик с наконечником и отламывающейся пломбой). 4 микроклизмы вместе с инструкцией по применению в картонной пачке.

Срок годности:
5 лет. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Примечание:
Маркировка срока годности на упаковке (период от даты производства до даты указанной в пункте «годен до») может быть меньше 5 лет на 1 месяц.

Условия хранения:
При температуре не выше 25^0 С в недоступном для детей месте.

Условия отпуска из аптек: без рецепта.

Производитель
«Пфайзер Хелс АБ», Швеция.
Юридический адрес: Pfizer Health AB, Norrbroplatsen 2, SE-251 09, Helsingborg, Sweden / «Пфайзер Хелс АБ», Швеция, Хельсингборг, SE-251 09, Норброплатцен 2.

Представительство в России (организация, принимающая претензии): Московское представительство компании «Пфайзер Интернэшнл ЭлЭлСи», 109147, г. Москва, ул. Таганская, д. 21.
Тел.: 258 5535, факс: 258 5538.

Директор ИДКЭЛС ФГУ «НЦЭСМП» С.В. Буданов

Представитель фирмы
специалист по регистрации Т.Х. Алифан