МИНЗДРАВ РОССИИ
П N011146/01- 300117
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Микролакс®
наименование лекарственного препарата



раствор для ректального введения
лекарственная форма, дозировка

Фамар Орлеан, Франция
наименование производителя, страна

Изменение № 4

Дата внесения Изменения «____» 300117 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Способ применения и дозы: *Взрослые и дети старше 3 лет* Вводить содержимое одной микроклизмы (5 мл) ректально, вставляя наконечник на всю длину. *Новорожденные и дети до 3-х лет* Вводить содержимое одной микроклизмы ректально, вставляя наконечник на половину длины (см. отметку на наконечнике). Если жалобы сохраняются в течение длительного времени, необходимо обратиться к врачу. <u>Указания по применению:</u>	**Способ применения и дозы:** *Взрослые и дети старше 3 лет* Вводить все содержимое одной микроклизмы ректально, вставляя наконечник на всю длину (длина универсального наконечника составляет 60,6 мм, см. рис. 1). *Новорожденные и дети до 3-х лет* Вводить все содержимое одной микроклизмы ректально, вставляя универсальный наконечник на половину длины (см. отметку на наконечнике, см. рис. 1). Рисунок 1:

Старая редакция	Новая редакция
Отломите пломбу на наконечнике тюбика. Слегка надавите на тюбик так, чтобы капля препарата смазала кончик клизмы – это облегчит процесс введения. При применении микроклизм по 5 мл у детей до 3-х лет введите наконечник клизмы в прямую кишку на половину длины, после 3-х лет введите наконечник клизмы в прямую кишку целиком. Сдавливая тюбик, выдавите полностью его содержимое. Извлеките наконечник, по-прежнему слегка сдавливая тюбик.	 *рисунок приведен в масштабе 1:1 Если жалобы сохраняются в течение длительного времени, то необходимо обратиться к врачу. Для детей до 3-х лет также возможно использование микроклизмы с укороченным наконечником (длина укороченного наконечника составляет 47,3 мм – см. рис. 2). В таком случае необходимо ввести все содержимое одной микроклизмы ректально, вставляя наконечник на всю длину. Рисунок 2:  * рисунок приведен в масштабе 1:1 <u>Указания по применению:</u> Отломите пломбу на наконечнике тюбика. Слегка надавите на тюбик так, чтобы капля препарата смазала кончик клизмы – это облегчит процесс введения.

Старая редакция	Новая редакция
	Сдавливая тюбик, выдавите полностью его содержимое. Извлеките наконечник, по-прежнему слегка сдавливая тюбик.
Форма выпуска Раствор для ректального введения. По 5 мл раствора для ректального введения в микроклизме для однократного применения (полиэтиленовый тюбик с наконечником и отламывающейся пломбой). По 4 или 12 микроклизм вместе с инструкцией по применению в картонной пачке.	**Форма выпуска** Раствор для ректального введения. По 5 мл раствора для ректального введения в микроклизме для однократного применения (полиэтиленовый тюбик с укороченным или универсальным наконечником и отламывающейся пломбой). По 4 микроклизмы с укороченным наконечником вместе с инструкцией по применению в картонной пачке. По 4 или 12 микроклизм с универсальным наконечником вместе с инструкцией по применению в картонной пачке.

Представитель фирмы
Специалист по регистрации



Е.С. Шигина