

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата

НАТРИЯ НУКЛЕИНАТ
(Natrium nucleinicum)

Регистрационный номер:

Торговое название: Натрия нуклеинат

Международное непатентованное название (МНН) или группировочное название:
натрия нуклеинат

Химическое название: натриевая соль рибонуклеиновой кислоты

Лекарственная форма: таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Состав:

1 таблетка содержит:

действующее вещество – Натрия нуклеинат (в пересчете на сухое вещество) – 250 мг.

Вспомогательные вещества: повидон низкомолекулярный (поливинилпирролидон низкомолекулярный медицинский (12600±2700)), кальция стеарат, крахмал картофельный.

Состав оболочки: гипромеллоза (оксипропилметилцеллюлоза), титана диоксид (двуокись титана), полисорбат-80 (твин-80), масло вазелиновое.

Описание: таблетки, покрытые пленочной оболочкой, белого с желтоватым или сероватым оттенком цвета, круглые, двояковыпуклые.

Фармакотерапевтическая группа: лейкопоэза стимулятор.

Код АТХ [L03AX].

Фармакологическое действие

Натрия нуклеинат выделяют из хлебопекарских дрожжей. Натрия нуклеинат обладает активностью поликлонального иммуностимулятора, регулируя миграцию Т-лимфоцитов и процессы кооперации Т- и В-лимфоцитов, усиливает фагоцитарную активность макрофагов и продукцию факторов неспецифической защиты. Обладает широким спектром биологической активности. Ускоряет процессы регенерации тканей, стимулирует деятельность костного мозга и лейкопоэз.

Показания к применению

Применяют у взрослых в комплексной терапии инфекционных заболеваний, протекающих на фоне вторичных иммунодефицитных состояний: хронические неспецифические заболевания легких, хронические рецидивирующие вирусные и бактериальные инфекции, вторичные иммунодефицитные состояния, связанные со старением, коррекция лейкопении и агранулоцитоза.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата, беременность, период лактации.

Способ применения и дозы

Внутрь, после еды. Суточная доза – 1-2 г в 3-4 приема. Курс лечения – 10 дней (в зависимости от тяжести заболевания – до 6 недель).

Пациентам пожилого и старческого возраста с пониженным иммунным статусом – по 1-1,5 г/сут. в течение 2-3 недель 2 раза в год (весной и осенью).

При лейкопении взрослым – по 1 таблетке 2-3 раза в сутки, курс лечения определяется индивидуально, в среднем составляет 10 дней.

Проведение курса терапии препаратом (в том числе для лечения хронических заболеваний) возможно два – три раза в течение года.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Не выявлено.

Форма выпуска

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг.

По 10, 20 или 50 таблеток в банке полимерной.

По 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной или бумаги с полимерным покрытием.

Одна банка, 1, 2 или 5 контурных ячейковых упаковок с инструкцией по применению помещены в пачку картонную.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте, при температуре не выше 25 °С.

Срок годности

2 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек

По рецепту.

Производитель

ОАО «Биосинтез».

Юридический адрес и адрес для принятия претензий

ОАО «Биосинтез», Россия, 440033 г. Пенза, ул. Дружбы, 4, тел/факс (8412) 57-72-49.

Генеральный директор
ОАО «Биосинтез»



Сорокин О.В.

