МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП-003355- 05 07 17
СОГЛАСОВАНО

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

ГУТТАСИЛ

Таблетки, 5,0 мг и 7,5 мг

ПАО «Фармак», Украина

Изменение № 1

Дата внесения Изменения «____» 05 07 17 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав: В одной таблетке 5 мг содержится: *активное вещество:* натрия пикосульфат моногидрат (в пересчете на натрия пикосульфат) – 5,0 мг; *вспомогательные вещества:* лактозы моногидрат – 96,8 мг, крахмал кукурузный – 12,0 мг, крахмал прежелатинизированный 1500 – 3,6 мг, кремния диоксид коллоидный – 1,2 мг, магния стеарат – 1,2 мг. В одной таблетке 7,5 мг содержится: *активное вещество:* натрия пикосульфат моногидрат (в пересчете на натрия пикосульфат) – 7,5 мг; *вспомогательные вещества:* лактозы моногидрат – 145,2 мг, крахмал кукурузный – 18,0 мг, крахмал прежелатинизированный 1500 – 5,4 мг, кремния диоксид коллоидный – 1,8 мг, магния стеарат – 1,8 мг.	**Состав:** В одной таблетке 5 мг содержится: *действующее вещество:* натрия пикосульфат в пересчете на 100 % безводное вещество – 5,0 мг; *вспомогательные вещества:* лактозы моногидрат – 96,8 мг, крахмал кукурузный – 12,0 мг, крахмал прежелатинизированный 1500 – 3,6 мг, кремния диоксид коллоидный – 1,2 мг, магния стеарат – 1,2 мг. В одной таблетке 7,5 мг содержится: *действующее вещество:* натрия пикосульфат в пересчете на 100 % безводное вещество – 7,5 мг; *вспомогательные вещества:* лактозы моногидрат – 145,2 мг, крахмал кукурузный – 18,0 мг, крахмал прежелатинизированный 1500 – 5,4 мг, кремния диоксид коллоидный – 1,8 мг, магния стеарат – 1,8 мг.

Старая редакция	Новая редакция
Форма выпуска Таблетки, 5 мг и 7,5 мг. Для дозировки 5 мг. По 10 таблеток в блистере из пленки поливинилхлоридной бесцветной и фольги алюминиевой печатной лакированной. По 1 блистеру вместе с инструкцией по медицинскому применению вкладывают в пачку из картона. Для дозировки 7,5 мг. По 10 таблеток в блистере из пленки поливинилхлоридной бесцветной и фольги алюминиевой печатной лакированной. По 1 или 3 блистера вместе с инструкцией по медицинскому применению вкладывают в пачку из картона.	**Форма выпуска** Таблетки, 5 мг и 7,5 мг. Для дозировки 5 мг. По 10 таблеток в блистере из пленки полимерной бесцветной и фольги алюминиевой печатной лакированной. По 1 блистеру вместе с инструкцией по медицинскому применению вкладывают в пачку из картона. Для дозировки 7,5 мг. По 10 таблеток в блистере из пленки полимерной бесцветной и фольги алюминиевой печатной лакированной. По 1 или 3 блистера вместе с инструкцией по медицинскому применению вкладывают в пачку из картона.

Генеральный директор
ООО «СОЛЮР-ФАРМА» **Д.Г. Шульгин**