

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
НАТРИЯ ТЕТРАБОРАТ

Регистрационный номер:

Торговое наименование Натрия тетраборат

Международное непатентованное или группировочное наименование Натрия тетраборат

Лекарственная форма раствор для местного и наружного применения

Состав

Действующее вещество:

Натрия тетраборат декагидрат - 20 г

Вспомогательное вещество:

Глицерол (глицерин) - 80 г

Описание

Прозрачная или слегка опалесцирующая, бесцветная или почти бесцветная, вязкая жидкость.

Фармакотерапевтическая группа

Антисептики и дезинфицирующие средства; препараты борной кислоты.

Код АТХ: D08AD

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Антисептическое средство. Обладает бактериостатической активностью. Эффективен при кандидозе. Удаляет мицелий гриба со слизистых оболочек, нарушает процесс прикрепления гриба к слизистым оболочкам и тормозит его размножение.

Фармакокинетика

При наружном применении адсорбция происходит в низкой степени; всасывается в желудочно-кишечном тракте (при смазывании слизистых оболочек полости рта), и на повреждённых участках кожных покровов. Выводится почками в неизменном виде и через кишечный тракт в течение одной недели.

Показания к применению

Кандидозные поражения слизистой оболочки полости рта, глотки, половых органов; опрелости, пролежни.

Противопоказания

Гиперчувствительность к натрия тетраборату и другим компонентам препарата, беременность, период лактации, детский возраст до 18 лет. Нарушение целостности слизистой оболочки и кожного покрова.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

Способ применения и дозы

Местно и наружно. Смазывают пораженные участки слизистой оболочки полости рта 2-3 раза в день. Курс лечения составляет 3-7 дней. При лечении вагинального кандидоза (молочницы) перед применением препарата необходимо провести спринцевание кипяченой водой или раствором ромашки, после чего тампон, смоченный в препарате, вводят во влагалище на 20-30 минут. Частота применения и курс лечения зависят от тяжести заболевания. При незначительных выделениях и зуде препарат применяют один раз в день лучше на ночь, а при обильных выделениях препарат применяют 2 раза в день (утром и вечером) в течение 7 дней.

Если после лечения улучшения не наступает или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции. В случае необходимости, проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата.

Побочные действия

Гиперемия, ощущение жжения в месте нанесения препарата, аллергические реакции. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Сведения о симптомах передозировки при местном и наружном применении отсутствуют.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не изучалось.

Особые указания

При монотерапии вагинального кандидоза с целью повышения эффективности необходимо, чтобы лечебные процедуры проводились медицинским персоналом

многократно, в противном случае мицелий гриба может задерживаться в криптах слизистой оболочки влагалища, что приводит к рецидиву заболевания.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не влияет на управление транспортными средствами и механизмами, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Раствор для местного и наружного применения 20 %. По 30 г, 50 г во флаконы оранжевого стекла с винтовой горловиной, укупоренные пробками полимерными и навинчиваемыми пластмассовыми крышками или навинчиваемыми крышками с уплотнительным элементом.

По 49 флаконов по 30 г или по 36 флаконов по 50 г вместе с равным количеством инструкций по применению помещают в групповую упаковку.

1 флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

1 флакон помещают в пачку, на которую нанесён полный текст инструкции по применению.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель/Владелец регистрационного удостоверения/Организация, принимающая претензии от потребителей

ОАО «Тверская фармацевтическая фабрика»

Россия, 170024, г. Тверь, Старицкое шоссе, д. 2

Тел./факс (4822) 44-41-19