МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП-001067 – 250521
СОГЛАСОВАНО

Конфумин®

раствор для инфузий

ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии» Федерального медико-биологического агентства, Россия

Изменение № 1

Дата внесения Изменения «___» 250521 20 г.

Старая редакция	Новая редакция
ИНСТРУКЦИЯ по применению лекарственного препарата для медицинского применения **Форма выпуска** Раствор для инфузий 15 % по 100 мл в бутылках вместимостью 100 мл из стекла (для стационаров), герметично укупоренных пробками из резины и обжатые алюминиевыми колпачками. По 28 бутылок помещают в ящик. Инструкцию по применению лекарст-	ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА **Форма выпуска** Раствор для инфузий 15 % по 100 мл в бутылках вместимостью 100 мл из стекла (для стационаров), герметично укупоренных пробками из резины и обжатые алюминиевыми колпачками. По 28 бутылок помещают в ящик. Инструкцию по медицинскому при-

Старая редакция	Новая редакция
венного препарата вкладывают в транспортную тару в количестве, равном количеству бутылок. Раствор для инфузий 15 % по 50 или 100 мл в контейнерах полимерных для инфузионных растворов однократного применения из поливинилхлорида или полиолефиновой пленки. Каждый контейнер упаковывают во вторичный прозрачный пакет с нанесенной на него инструкцией по применению лекарственного препарата. Вторичный пакет изготовлен из полипропилена. Контейнеры во вторичной упаковке помещают в транспортную тару (ящики из гофрированного картона). От 1 до 48 контейнеров вместимостью 50 и 100 мл из полиолефиновой пленки могут быть упакованы в транспортную тару (ящики из гофрированного картона) без вторичного пакета (для стационаров). В ящик с контейнерами вкладывают инструкции по применению лекарственного препарата в количестве, равном количеству контейнеров.	менению лекарственного препарата вкладывают в ящик в количестве, равном количеству бутылок. Раствор для инфузий 15 % по 50 или 100 мл в контейнерах полимерных для инфузионных растворов однократного применения из полиолефиновой пленки. Каждый контейнер упаковывают во вторичный прозрачный пакет с нанесенной на него инструкцией по медицинскому применению лекарственного препарата. Вторичный пакет изготовлен из полипропилена. Контейнеры во вторичной упаковке помещают в ящики из гофрированного картона. *Для стационаров.* По 90 или 48 контейнеров вместимостью 50 мл, по 68 или 44 контейнеров вместимостью 100 мл из полиолефиновой пленки помещают во вторичную упаковку (ящики из гофрированного картона). От 1 до 90 контейнеров вместимостью 50 и 100 мл из полиолефиновой пленки помещают во вторичную упаковку (ящики из гофрированного картона). В ящик с контейнерами вкладывают инструкции по медицинскому приме-

Старая редакция	Новая редакция
	нению лекарственного препарата в количестве, равном количеству контейнеров.
Организация-правообладатель Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУ РосНИИГТ ФМБА России) 191024, г. Санкт-Петербург, ул. 2-ая Советская, д. 16. Тел. (812) 274-56-50. Факс (812) 274-92-27.	**Владелец/держатель регистрационного удостоверения** Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУ РосНИИГТ ФМБА России) 191024, г. Санкт-Петербург, ул. 2-ая Советская, д. 16. Тел. (812) 274-56-50. Факс (812) 274-92-27.

Директор
ФГБУ РосНИИГТ ФМБА России
доктор медицинских наук, профессор _____ А.В.Чечеткин
подпись