

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
Натрия хлорид

Регистрационный номер:

Торговое название: Натрия хлорид

Международное непатентованное или группировочное название: Натрия хлорид

Лекарственная форма: раствор для инфузий

Состав:

натрия хлорид – 9,0 г

вода для инъекций – до 1 л.

кислота хлористоводородная 0,1М раствор до pH 5,0 – 7,5

натрия гидроксид 0,1М раствор до pH 5,0 – 7,5

Теоретическая осмолярность – 308 мОсм/л,

Описание: прозрачная бесцветная жидкость.

Фармакотерапевтическая группа: регидратирующее средство.

Код АТХ: [B05CB01].

Фармакологическое действие

Оказывает дезинтоксикационное и регидратирующее действие. Восполняет дефицит натрия при различных патологических состояниях организма и временно увеличивает объем жидкости, циркулирующей в сосудах.

Фармакокинетика

Быстро выводится почками без изменений.

Показания к применению

Изотонический раствор натрия хлорида применяют для растворения лекарственных препаратов, а также при больших потерях внеклеточной жидкости или недостаточном ее поступлении (токсическая диспепсия, холера, диарея, неукротимая рвота, обширные ожоги с сильной экссудацией и др.), гипохлоремия и гипонатриемия с обезвоживанием, кишечная непроходимость, интоксикации, для промывания ран, глаз, слизистой оболочки носа, для регионарной перфузии совместно с гепарином, противоопухолевыми и другими лекарственными средствами.

Противопоказания

Гипернатриемия, ацидоз, гиперхлоремия, гипокалиемия, внеклеточная гипергидратация, циркуляторные нарушения, угрожающие отеком мозга и легких, отек мозга, отек легких, острая левожелудочковая



недостаточность,сопутствующее назначение глюкокортикостероидов в больших дозах

С осторожностью: декомпенсированная хроническая сердечная недостаточность, хроническая почечная недостаточность (олиго-анурия).

Применение во время беременности и в период лактации

Сведения отсутствуют.

Способ применения и дозы

Изотонический раствор натрия хлорида для инфузий вводят внутривенно (обычно капельно), подкожно, ректально или местно (для промывания ран, глаз, слизистой оболочки полости носа), для увлажнения перевязочного материала.

Перед введением раствор нагревают до 36-38°C. Доза определяется в зависимости от потери организмом жидкости, ионов натрия и хлора - в среднем составляет 1000 мл/сутки. При больших потерях жидкости и выраженной интоксикации возможно введение до 3000 мл/сутки. Скорость введения - 540 мл/ч (180 кап/мин); при необходимости - скорость введения увеличивают.

Детям при выраженном снижении артериального давления на фоне дегидратации (до определения лабораторных параметров) вводят 20-30 мл/кг. В дальнейшем режим дозирования корректируется в зависимости от лабораторных показателей.

Побочное действие

Введение больших объемов изотонического раствора натрия хлорида может привести к хлоридному ацидозу и гипергидратации, а также к гипокалиемии.


Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Совместим с коллоидными гемодинамическими кровезаменителями (взаимное усиление эффекта).

При смешивании с другими лекарственными средствами необходимо визуально контролировать совместимость.

Особые указания

При длительном введении больших доз изотонического раствора натрия хлорида необходимо проводить контроль кислотно-основного состояния и электролитов в плазме крови и моче.



При значительном обезвоживании при невозможности внутривенного введения вводят подкожно или ректально.

Форма выпуска

Раствор для инфузий 0,9 % по 200, 400 мл в бутылках стеклянных.
1 бутылка с инструкцией по применению в пачке из картона.
15 бутылок вместимостью 450 мл или 15, 28 бутылок вместимостью 250 мл вместе с инструкциями по применению в количестве, соответствующем количеству первичных упаковок, в ящики из гофрокартона (для стационаров).

Срок годности: 2 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия хранения

- В сухом месте при температуре не выше 25°C.
В случае изменения окраски препарата или появления взвеси, раствор не пригоден к употреблению.
- Замораживание препарата при условии сохранности герметичности бутылки не является противопоказанием к применению препарата.
- Несмачиваемость внутренней поверхности бутылок не является противопоказанием к применению препарата.
- Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска

По рецепту.

Производитель/организация, принимающая претензии потребителей:

ОАО «МОСФАРМ», Россия.

141342, Московская область, Сергиево-Посадский район,
поселок Богородское, д. 63

Тел./факс (8496) 5479859

И.О. директора ИДКОЛС

А.Н.Васильев

Генеральный директор
ОАО «МОСФАРМ»

Ю.Г.Присяжнюк

