

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Натрия хлорид, раствор для инфузий, 0,9 %

ООО «МОСФАРМ», Россия

Изменение № 3


Дата внесения Изменения «___» 12 02 18 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Форма выпуска Раствор для инфузий, 0,9 % по 100, 200, 400 мл в бутылках стеклянных. 1 бутылка с инструкцией по применению лекарственного препарата в пачке из картона. Допускается наносить текст инструкции по применению типографским способом на пачку без вложения инструкции по применению лекарственного препарата. Для стационаров: 36 бутылок без вложения в пачку объемом 100 мл, или 15, 28 бутылок объемом 200 мл, или 15 бутылок объемом 400 мл вместе с инструкциями по применению лекарственного	Форма выпуска Раствор для инфузий, 0,9 % по 100, 200, 400 мл в бутылках стеклянных. 1 бутылка с инструкцией по применению лекарственного препарата в пачке из картона. Допускается наносить текст инструкции по применению типографским способом на пачку без вложения инструкции по применению лекарственного препарата. Для стационаров: 36 бутылок без вложения в пачку объемом 100 мл, или 15, 28 бутылок объемом 200 мл, или 15 бутылок объемом 400 мл вместе с инструкциями по применению лекарственного

препарата в количестве, соответствующем количеству единиц первичных упаковок, в ящике из картона. По 100, 200, 250, 300, 400, 500, 1000, 2000, 3000 в полимерные контейнеры. Контейнер помещают в мешок из полиэтиленовой пленки. Для стационаров полимерный контейнер не упаковывают в мешок из полимерной пленки. 44 контейнера объемом 100 мл, 32 контейнера объемом 200 мл, 28 контейнеров объемом 250 мл, 20 контейнеров объемом 300 мл, 16 контейнеров объемом 400 мл, 12 контейнеров объемом 500 мл, 6 контейнеров объемом 1000 мл, 4 контейнера объемом 2000 мл, 2 контейнера объемом 3000 мл, в мешках из полиэтиленовой пленки вместе с руководством по использованию полимерных контейнеров с инфузионным раствором помещают в ящик из картона. Для стационаров: полимерные контейнеры без вложения в мешок из полиэтиленовой пленки упаковывают в ящик из картона	препарата в количестве, соответствующем количеству единиц первичных упаковок, в ящике из картона. По 100, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1500, 2000, 3000 в полимерные контейнеры. Контейнер помещают в мешок из полиэтиленовой пленки. Для стационаров: полимерные контейнеры без вложения в мешок из полиэтиленовой пленки по 44 контейнера объемом 100 мл, по 32 контейнера объемом 200 мл, по 24 или 28 контейнеров объемом 250 мл, по 20 контейнеров объемом 300 мл, по 16 контейнеров объемом 400 мл, по 12 контейнеров объемом 500 мл, по 10 контейнеров объемом 600 мл, по 8 контейнеров объемом 800 мл, по 6 контейнеров объемом 1000 мл, по 3 контейнера объемом 1500 мл, по 4 контейнера объемом 2000 мл, по 2 контейнера объемом 3000 мл упаковывают в ящик из картона вместе с руководством по использованию полимерных контейнеров с инфузионным раствором. Если на поверхность полимерного
--	--

вместе с руководством по использованию полимерных контейнеров с инфузионным раствором. Если на поверхность полимерного контейнера или мешка из полиэтиленовой пленки не нанесен текст инструкции по применению лекарственного препарата, то в ящик вкладывают инструкции по применению препарата в количестве, соответствующем количеству полимерных контейнеров	контейнера или мешка из полиэтиленовой пленки не нанесен текст инструкции по применению лекарственного препарата, то в ящик вкладывают инструкции по применению препарата в количестве, соответствующем количеству полимерных контейнеров.
--	---

Генеральный директор
ООО «МОСФАРМ»



Шуляцкий Д. В.