

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Кордиамин**Регистрационный номер:****Торговое наименование:** Кордиамин**Международное непатентованное или группировочное наименование:** Никетамид**Лекарственная форма:** капли для приема внутрь**Состав****1 мл препарата содержит:***Действующее вещество*

Никетамид (диэтиламид никотиновой кислоты) 250,0 мг

Вспомогательное вещество

Вода очищенная до 1 мл

Описание: прозрачная, бесцветная или слегка желтоватого или зеленоватого цвета жидкость с характерным запахом.**Фармакотерапевтическая группа:** другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы; стимуляторы дыхания.**Код АТХ:** R07AB02**Фармакологические свойства****Фармакодинамика**

Обладает аналептическим действием. Стимулирует центральную нервную систему: оказывает возбуждающее действие на сосудодвигательный центр продолговатого мозга (особенно при его угнетении), что приводит к опосредованному повышению системного артериального давления. Возбуждает дыхательный центр за счет стимулирующего влияния на хеморецепторы синокаротидной рефлексогенной зоны, что приводит к увеличению частоты и глубины дыхательных движений. Препарат не обладает прямым стимулирующим действием на сердце и прямым стимулирующим сосудосуживающим эффектом.

Фармакокинетика

Хорошо всасывается при любом пути введения. Подвергается быстрой биотрансформации в печени с образованием неактивных метаболитов, экскретирующихся в основном почками.

Показания к применению

Коллапс, состояния, сопровождающиеся снижением артериального давления, снижением сосудистого тонуса и ослаблением дыхания при инфекционных болезнях и в период выздоровления.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату, эпилепсия, судороги в анамнезе и предрасположенность к судорогам, гипертермия у детей, беременность, период грудного вскармливания.

С осторожностью

Детям следует применять препарат только под контролем врача.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Препарат противопоказан в период беременности и грудного вскармливания. При необходимости применения препарата Кордиамин в период лактации грудное вскармливание следует прекратить.

Способ применения и дозы

Режим дозирования

Взрослые

По 15-40 капель на прием 2-3 раза в день. Высшая разовая доза для взрослых – 60 капель, суточная – 180 капель.

Дети от 10 лет

По 10 капель 2-3 раза в день.

Дети до 10 лет

2-3 раза в день, количество капель на 1 прием должно равняться числу полных лет пациента. Для определения целесообразности курсового применения препарата необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения

Внутрь, независимо от приема пищи.

Побочное действие

Резюме нежелательных реакций

Нежелательные реакции представлены по классам систем органов и частоте их проявления: *очень часто ($\geq 1/10$), часто ($\geq 1/100$, но $< 1/10$), нечасто ($\geq 1/1000$, но $< 1/100$), редко ($\geq 1/10000$, но $< 1/1000$), очень редко ($< 1/10000$), частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно).*

Со стороны желудочно-кишечного тракта

Рвота.

Со стороны сердечно-сосудистой системы

Нарушение сердечного ритма.

Со стороны нервной системы

Беспокойство, тревога, мышечные подергивания (начинающиеся с круговых мышц рта), тонико-клонические судороги, гиперемия лица.

Аллергические реакции

Зуд кожных покровов.

Передозировка

Симптомы

Тонико-клонические судороги, усиление выраженности побочных эффектов.

Лечение

Симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Судорожное действие кордиамина усиливается резерпином; возбуждающий эффект относительно дыхательного центра устраняется средствами для общей анестезии; действие препарата ослабляют аминосалициловая кислота и опиiniaзид; к ослаблению аналептического эффекта и судорожного влияния приводят хлорпромазин и другие производные фенотиазина.

Усиливает эффекты психостимуляторов и антидепрессантов. Снижает действие наркотических анальгетиков, снотворных, нейролептиков, транквилизаторов, противосудорожных средств.

Особые указания

Перед началом применения препарата Кордиамин, а также в случае развития нехарактерных симптомов, следует проконсультироваться с врачом.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

В период лечения препаратом следует воздержаться от выполнения потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчером, работа оператором).

Форма выпуска

Капли для приема внутрь, 250 мг/мл.

По 15, 25, 30 или 50 мл помещают в стеклянный флакон-капельницу, закупоренный пробкой-капельницей полиэтиленовой и крышкой навинчиваемой.

На флакон-капельницу наклеивают этикетку на основе самоклеящейся пленки или этикетку из бумаги этикеточной, или писчей.

Каждый флакон-капельницу вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Срок годности

3 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия хранения

Хранить в защищенном от света месте, при температуре от 2 до 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения / Организация, принимающая претензии потребителей

Российская Федерация.

Акционерное общество «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод» (АО «Усолье-Сибирский химфармзавод»).

665452, Иркутская обл., г.о. город Усолье-Сибирское, тер. Промышленный массив, ул. Индустриальная, зд. 62.

Тел.: +7 (395) 435-89-08.

Электронная почта: usolpharm@usolpharm.ru

Производитель

Российская Федерация.

Акционерное общество «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод» (АО «Усолье-Сибирский химфармзавод»).

665452, Иркутская обл., г.о. город Усолье-Сибирское, тер. Промышленный массив, ул. Индустриальная, зд. 62.