

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата

Никетамид – ЭСКОМ

Регистрационный номер

Торговое название: Никетамид - ЭСКОМ.

Лекарственная форма: раствор для инъекций.

МНН: никетамид.

Состав:

Активные компоненты: никетамида (в пересчете на сухое вещество) - 250,0 мг.

Вспомогательные вещества: воды для инъекций до 1 мл.

Описание: Прозрачная бесцветная или слегка окрашенная жидкость со своеобразным запахом.

Фармакотерапевтическая группа: аналептическое средство.

Код АТХ: R07AB02.

Фармакологические свойства

Аналептическое средство смешанного типа действия (стимуляция центральной нервной системы (ЦНС), прямое и рефлекторное возбуждение дыхательного и сосудодвигательного центров). Механизм действия складывается из 2 компонентов: центрального и периферического. Центральный механизм связан с непосредственным влиянием на сосудодвигательный центр продолговатого мозга, приводящим к его возбуждению и опосредованному повышению системного артериального давления (АД) (особенно при изначальном угнетении данного центра). Периферический компонент механизма действия связан с возбуждением хеморецепторов каротидного синуса, что приводит к увеличению частоты и глубины дыхательных движений. Непосредственного влияния на сердечно-сосудистую систему (ССС) не оказывает.

Фармакокинетика. Абсорбция - высокая, не зависит от пути введения. Подвергается быстрому метаболизму в печени с образованием неактивных метаболитов. Выведение в основном почками.



Показания к применению

Коллапс, асфиксия (в т.ч. новорожденных), шоковые состояния, нарушение кровообращения и дыхания при инфекционных заболеваниях, отравление снотворными, наркотическими анальгетиками, барбитуратами.

Противопоказания

Гиперчувствительность, предрасположенность к судорогам, эпилепсия, эпилептические припадки (в анамнезе), гипертермия у детей, беременность, период лактации.

Способ применения и дозы

Взрослым вводят подкожно, внутримышечно и внутривенно в дозе 1-2 мл 1-3 раза в сутки. Внутривенное введение осуществляется медленно. Детям – подкожно, в зависимости от возраста, в дозе 0,1 – 0,75 мл. При интоксикации наркотиками, анальгетиками, снотворными взрослым внутривенно (можно подкожно или внутримышечно) вводят 3-5- мл препарата. Поскольку подкожные и внутримышечные инъекции никетамида болезненны, для уменьшения болей в зависимости от ситуации в место инъекции предварительно вводят прокаин (1 мл 0,5 % раствора). Высшие дозы для взрослых подкожно: разовая - 2 мл, суточная - 6 мл. Высшая разовая доза для подкожного и внутривенного введения при отравлениях наркотиками составляет 5 мл.

Побочные эффекты

Тревожность, мышечные подергивания (начинающиеся с круговых мышц рта), гиперемия кожи лица, зуд кожных покровов, рвота, аритмии; инфильтрация и болезненность в месте введения, аллергические реакции.

Передозировка

Симптомы: усиление выраженности побочных эффектов, тонико-клонические судороги. Лечение симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Усиливает эффекты психостимуляторов, антидепрессантов. Снижает действие наркотических анальгетиков, снотворных, антипсихотических лекарственных средств (ЛС) (нейролептиков), анксиолитиков, противоэпилептических ЛС. Эффект снижают парааминобензойная кислота, опиоиды, производные фенотиазина и ЛС для общей анестезии. Судорожное действие препарата усиливает резерпин.

Особые указания

Нет сведений о безопасности применения у кормящих женщин.

Форма выпуска

Раствор для инъекций 250 мг/мл.

По 1 мл препарата в ампулы.



По 5 или 10 ампул помещают в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной.

По 1 или 2 контурной ячейковой упаковке вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

Условия хранения

Список Б. В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

Отпускается по рецепту врача.

Производитель

ОАО НПК «ЭСКОМ», 355107, г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, д. 9 Г.

Тел.: (8652) 94-68-08, факс: (8652) 94-68-12.

Претензии потребителей направлять в адрес производителя.

И.о. директора



А.Н. Васильев

Директор по развитию
ОАО Научно-производственного
концерна «ЭСКОМ»



С.А. Рожнова