МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Пиканоил ®

наименование лекарственного препарата

Регистрационный номер:

Торговое название препарата:

Пиканоил®

Международное непатентованное название:

Никотиноил-гамма-аминомасляная кислота

Лекарственная форма:

Таблетки

Состав:

Активное вещество: никотиноил-гамма-аминомасляной кислоты натриевая соль - 20 мг или 50 мг;

вспомогательные вещества для таблеток с дозировкой активного вещества 20 мг: крахмал картофельный – 21,0 мг, магния гидроксикарбоната гидрат - 15,2 мг, сахар-рафинад (сахароза) - 40,8 мг, кальция стеарат - 1,0 мг, тальк- 2,0 мг.

вспомогательные вещества для таблеток с дозировкой активного вещества 50 мг: крахмал картофельный – 52,5 мг, магния гидроксикарбоната гидрат - 38,0 мг, сахар-рафинад (сахароза)- 102 мг, кальция стеарат- 2,5 мг, тальк - 5,0 мг.

Описание:

Круглые плоскоцилиндрические таблетки белого цвета с риской и фаской.

Фармакотерапевтическая группа:

Ноотропное средство

Код АТХ:

[N06BX]

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Ноотропное средство, расширяет сосуды головного мозга. Оказывает также транквилизирующее, психостимулирующее, антиагрегантное и антиоксидантное действие. Улучшает функциональное состояние мозга за счет нормализации метаболизма тканей и влияния на мозговое кровообращение (увеличивает объемную и линейную скорость мозгового кровотока, уменьшает сопротивление мозговых сосудов, ингибирует агрегацию тромбоцитов, улучшает микроциркуляцию).

При курсовом приеме повышает физическую и умственную работоспособность, уменьшает головную боль, улучшает память, нормализует сон; способствует снижению или исчезновению чувства тревоги, напряжения, страха; улучшает состояние больных с двигательными и речевыми нарушениями, уменьшает угнетающее влияние этанола на центральную нервную систему. Улучшает кровообращение в сосудах клетчатки и зрительного нерва.

Фармакокинетика

Абсорбция - быстрая и полная. Проникает через гематоэнцефалический барьер, длительно удерживается в тканях организма. Биодоступность - 50-88 %. Выводится, в основном, почками в неизмененном виде. Период полувыведения - 0,51 часа.

Показания к применению

Цереброваскулярная недостаточность, астения, депрессивные расстройства в пожилом возрасте. Состояния, сопровождающиеся тревогой, страхом, повышенной раздражительностью, эмоциональной лабильностью. Астенические состояния, обусловленные различными нервно-психическими

заболеваниями.

В составе комплексного лечения - для купирования острой алкогольной интоксикации; при хроническом алкоголизме - для уменьшения астенических, астеноневротических, постпсихотических, предрецидивных состояний, а также алкогольной энцефалопатии.

В составе комплексной терапии - мигрень (профилактика), ЧМТ, нейроинфекция.

Улучшение переносимости физических и умственных нагрузок (лицам, находящимся в напряженных и экстремальных условиях деятельности; для восстановления физической работоспособности спортсменов, для повышения устойчивости к физическим и умственным нагрузкам).

В урологической практике (у детей старше 3 лет и у взрослых с расстройствами мочеиспускания) для улучшения адаптационной функции мочевого пузыря (снижение гипоксии детрузора).

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата, хроническая почечная недостаточность, дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорция, дети до 3-х лет. Препарат противопоказан у детей по всем показаниям, кроме расстройств мочеиспускания, при котором он применяется с 3-х лет.

Если у Вас одно из перечисленных заболеваний, перед приемом препарата **обязательно проконсультируйтесь с врачом.**

С осторожностью

Перед началом приема препарата необходимо обратиться к врачу.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

При беременности и в период грудного вскармливания препарат принимать не рекомендуется, так как исследования по влиянию на беременность и проникновение в грудное молоко не проводились.

Способ применения и дозы

Внутрь, независимо от приема пищи.

При цереброваскулярных заболеваниях разовая доза - 20-50 мг 2-3 раза в сутки, суточная доза - 60-150 мг. Курс лечения - 1-2 мес. Повторный курс - через 5-6 мес.

Депрессивные состояния позднего возраста - 40-200 мг/сут за 2-3 приема, оптимальная доза - 60-120 мг/сут, в течение 1,5-3 мес.

В качестве антиастенического и анксиолитического средства - по 40-80 мг/сут, при необходимости - до 200-300 мг/сут, в течение 1-1,5 мес.

Для профилактики приступов мигрени по 50 мг 3 раза в день, для купирования приступа - 100 мг однократно.

При алкоголизме в период абстиненции - 100-150 мг/сут, коротким курсом 6-7 дней; при более стойких нарушениях вне абстиненции - суточная доза 40-60 мг в течение 4-5 нед.

Для восстановления работоспособности и при повышенных нагрузках - 60-80 мг/сут в течение 1-1,5 месяцев, для спортсменов в той же дозе, в течение 2 - х недель тренировочного периода.

При расстройствах мочеиспускания: 20 мг 2-3 раза в день (для детей от 3 до 10 лет); 50 мг 2 раза в день (для детей от 11 до 15 лет), 50 мг 3 раза в день (для пациентов старше 15 лет). Курс лечения 1 месяц.

Побочное действие

Аллергические реакции (кожная сыпь, зуд), головокружение, головная боль, легкая тошнота, раздражительность, тревога, ажитация.

При появлении вышеперечисленных признаков немедленно **обратитесь к врачу**.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, **сообщите об этом врачу.**

Передозировка

Усиление дозозависимых побочных эффектов. Лечение симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Укорачивает время действия барбитуратов, усиливает действие опиоидных анальгетиков.

Особые указания

Перед применением препарата необходимо проконсультироваться с врачом. В период лечения следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и работе с движущимися механизмами.

Форма выпуска

Таблетки по 20 мг или 50 мг. По 30 таблеток в банки полимерные с контролем первого вскрытия и амортизатором. Свободное пространство в банках заполняют ватой медицинской гигроскопической.

Каждую банку вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона коробочного.

Срок годности

5 лет. Не использовать позже срока, указанного на упаковке.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить недоступном для детей месте.

Условия отпуска из аптек

По рецепту.

Производитель

ЗАО «НПК ЭХО», Россия,

117246, Москва, Научный проезд, 14а, стр. 3;

телефон: (499) 120-51-62; факс: (499) 743-02-64.

Директор ЗАО «НПК ЭХО» И.Г.Гитлин