

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Нимика

таблетки диспергируемые 50 мг, 100 мг

Ипка Лабораториз Лимитед, Индия

Изменение № 3

Дата внесения Изменения « 08 » ноября 2010 г.

Старая редакция	Новая редакция
Форма выпуска По 10 таблеток в стрипах и блистерах по 50 и 100 мг. Стеклянные флаконы янтарного цвета с суспензией для приема внутрь 50 мг/ 5 мл по 30 мл.	Форма выпуска Таблетки диспергируемые 50 мг, 100 мг. 10 таблеток в блистер Ал/Ал по 50 и 100 мг. 2 или 10 блистеров в картонную пачку вместе с инструкцией по применению. Суспензия для приема внутрь 50 мг/5 мл. По 30 мл препарата во флакон из темного стекла, укупоренный навинчиваемой алюминиевой крышкой. По 1 флакону вместе с инструкцией по применению и мерным колпачком помещают в пачку картонную.

Представитель компании
Ипка Лабораториз Лимитед, Индия

Мартынова К.В.