МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНЗДРАВ РОССИИ
№ П013667/02-170914
СОГЛАСОВАНО

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Нимотоп®
наименование лекарственного препарата

раствор для инфузий, 0,2 мг/мл
лекарственная форма, дозировка

Байер Фарма АГ, Германия
наименование производителя, страна

Изменение № 4

Дата внесения Изменения «____» 170914 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав: Один флакон с 50 мл инфузионного раствора содержит 10 мг нимодипина (активное вещество). Вспомогательные вещества: этанол 96% - 10 г, макрогол 400 – 8,5 г, натрия цитрат – 0,1 г, лимонная кислота безводная – 15 мг, вода для инъекций – 31,225 г.	**Состав:** Один флакон с 50 мл инфузионного раствора содержит 0,01 г нимодипина (активное вещество). Вспомогательные вещества: этанол 96% - 10 г, макрогол 400 – 8,5 г, натрия цитрат – 0,1 г, лимонная кислота безводная – 0,015 г, вода для инъекций – 31,225 г.

Старая редакция	Новая редакция
ФОРМА ВЫПУСКА. Раствор для инфузий, 0,2 мг/мл. По 50 мл во флаконы коричневого стекла; по 1 флакону вместе с инструкцией по применению и полиэтиленовой соединительной трубкой для инфузомата в картонную коробку. По 50 мл во флаконы коричневого стекла, по 1 флакону вместе с инструкцией по применению и полиэтиленовой соединительной трубкой для инфузомата в картонную пачку, по 5 картонных пачек упаковывают в полиэтиленовую пленку.	**ФОРМА ВЫПУСКА.** Раствор для инфузий, 0,2 мг/мл. По 50 мл во флаконы коричневого стекла; по 1 флакону вместе с инструкцией по применению и полиэтиленовой соединительной трубкой для инфузомата в картонную пачку. По 50 мл во флаконы коричневого стекла, по 1 флакону вместе с инструкцией по применению и полиэтиленовой соединительной трубкой для инфузомата в картонную пачку, по 5 картонных пачек упаковывают в полиэтиленовую пленку.

Руководитель отдела
Регистрации и сертификации Бычева Е.И.

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО Г.Р. №05141
"БАЙЕР"
A/O "BAYER"
МОСКВА