

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
НИСТАТИН

Регистрационный номер

Торговое название: НИСТАТИН

Международное непатентованное название: нистатин

Лекарственная форма: таблетки, покрытые оболочкой

Состав:

1 таблетка содержит:

Активное вещество: нистатин 250000 или 500000 ЕД.

Вспомогательные вещества: лактоза (сахар молочный), крахмал картофельный, поливинилпирролидон низкомолекулярный медицинский (повидон), желатин, тальк, кислота стеариновая, микрокристаллическая целлюлоза, титана диоксид, желтый водорастворимый краситель (КФ-6001), эмульсия КЭ 10-16, ванилин, твин-80.

Описание: таблетки, покрытые оболочкой, светло-желтого с зеленоватым оттенком цвета, двояковыпуклой формы, с запахом ванилина, на поперечном разрезе видны два слоя.

Фармакотерапевтическая группа

Противогрибковое средство.

Код АТХ: А07АА02

Фармакологические свойства

Антибиотик полиеновой группы, продуцируемый актиномицетом *Streptomyces noursei*, высокоактивный в отношении дрожжеподобных грибов рода *Candida*. В структуре антибиотика имеются двойные связи, обладающие высокой тропностью к стероловым структурам цитоплазматической мембраны грибов, что способствует встраиванию молекулы препарата в мембрану клетки и образованию большого количества каналов, через которые осуществляется бесконтрольный транспорт электролитов; повышение осмолярности внутри клетки приводит к ее гибели. Толерантность развивается медленно.

Фармакинетика

Обладает слабым резорбтивным действием, практически не всасывается в желудочно-кишечном тракте.

Показания к применению

Профилактика кандидоза слизистых желудочно-кишечного тракта при длительном лечении антибактериальными средствами (особенно у истощенных и ослабленных больных).

Противопоказания

Гиперчувствительность, печеночная недостаточность, панкреатит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, беременность, период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Применяют внутрь, независимо от приема пищи.

Взрослым назначают по 500000 ЕД 4-8 раз в сутки.

Детям в возрасте от 1 года до 5 лет – 250000 ЕД 3-4 раза в день, старше 13 лет – по 250000-500000 ЕД 4 раза в день.

Продолжительность курса – 10-14 дней. При необходимости через неделю курс может быть повторен.

Побочное действие

Тошнота, рвота, диарея, абдоминальные боли, гипертермия, озноб, аллергические реакции.

Взаимодействие с другими препаратами

При одновременном применении нистатина с клотримазолом активность последнего снижается.

Форма выпуска

Таблетки, покрытые оболочкой, 250000 ЕД и 500000 ЕД.

По 20 таблеток в банки из оранжевого стекла с натягиваемыми крышками или во флаконы полиэтиленовые с навинчиваемыми крышками. По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку. Каждую банку оранжевого стекла или 2 контурные ячейковые упаковки с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. Флаконы полиэтиленовые с инструкциями по применению помещают в коробку из картона. По 1 кг или 5 кг в пакет из пленки полиэтиленовой, вложенный в мешок из бумаги мешочной или в коробку из картона.

Условия хранения

Список Б.

В сухом, защищенном от света месте, при температуре от 12 до 20°C.

В местах недоступных для детей.

Срок годности

2 года.

Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек

По рецепту.

Производитель:

ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический завод
623856, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Кирова, 172
тел: (34355) 3-61-01, факс: (34355) 3-60-73

Директор ИДКЭЛС, профессор

Исполнительный директор
ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический завод»

В.В. Чельцов

В.В. Николаев