

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
ФУРАЦИЛИН

Торговое наименование: Фурацилин

Международное непатентованное наименование: Нитрофурал

Лекарственная форма: мазь для местного и наружного применения

Состав на 100 г:

Действующее вещество:

Фурацилин (нитрофурал) – 0,2 г

Вспомогательное вещество:

Вазелин

Описание:

Мазь желтого цвета.

Фармакотерапевтическая группа:

Противомикробное средство: антисептики и дезинфицирующие средства; производные нитрофурана.

Код АТХ: D08AF01

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Противомикробное средство, в отличие от других химико-терапевтических лекарственных средств вызывает конформационные изменения белков и других макромолекул, приводя к гибели клеток.

Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (*Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Shigella dysenteriae spp.*, *Shigella flexneri spp.*, *Shigella boydii spp.*, *Shigella sonnei spp.*, *Escherichia coli*, *Clostridium perfringens*, *Salmonella spp.* и др.).

Устойчивость развивается медленно и не достигает высокой степени. Увеличивает активность РЭС, усиливает фагоцитоз.

Фармакокинетика

Абсорбция – быстрая и полная. T_{сmax} - 6 ч. Легко проникает через гистогематические барьеры и равномерно распределяется в жидкостях и тканях. Основной путь метаболизма - восстановление нитрогруппы. Выводится почками и частично с желчью.

Показания к применению

Показан к применению у взрослых и детей старше 12 лет при:

- гнойных ранах;

- пролежнях;
- ожогах и отморожениях II-III степени;
- мелких повреждениях кожи и слизистых оболочек (в том числе ссадины, царапины, трещины, порезы).

Противопоказания

гиперчувствительность к компонентам препарата, кровотечение, аллергодерматозы, детский возраст до 12 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания возможно, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка. Перед применением препарата, если Вы беременны или предполагаете, что Вы могли бы быть беременной, или планируете беременность, или в период грудного вскармливания необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы

Режим дозирования

Взрослые

Наносят тонким слоем на пораженные участки кожи 2-3 раза в сутки. Количество наносимой мази зависит от обширности очага поражения.

Дети

От 0 до 12 лет

Безопасность и эффективность препарата Фурацилин у детей в возрасте от 0 до 12 лет не установлены. Данные отсутствуют

От 12 до 18 лет

Режим дозирования не отличается от режима дозирования для взрослых

Способ применения

Местно, наружно.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

Возможны местные аллергические реакции, дерматит.

Передозировка

О случаях передозировки не сообщалось.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не изучалось.

Особые указания

Мазь предназначена только для местного и наружного применения, не допускать попадания в глаза, нос, рот. После нанесения препарата необходимо тщательно вымыть руки.

При случайном попадании препарата в глаза, нос, рот необходимо обильно промыть их проточной водой.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат не влияет на способность управлять транспортом или заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Мазь для местного и наружного применения 0,2%

По 25 г в банках оранжевого стекла с треугольным венчиком укупоренных крышками натягиваемыми пластмассовыми, или в банках оранжевого стекла с винтовой горловиной, укупоренных крышками навинчиваемыми пластмассовыми, или в банках полимерных из полиэтилена или полипропилена, или полиэтилентерефталата в комплекте с крышками натягиваемыми или навинчиваемыми с контролем первого вскрытия или без контроля первого вскрытия из полиэтилена или полипропилена, или в тубах алюминиевых укупоренных колпачками (бушонами) навинчиваемыми из полиэтилена или полипропилена.

Каждую банку или тубу вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку картонную. Допускается вкладывать в пачку картонную аппликатор, для нанесения мази.

Упаковка для стационаров. По 1 кг, 2 кг или 5 кг в ведрах полимерных из полипропилена с крышками «для стационаров». Ведра дополнительно снабжают (наклеивают или вкладывают в специальный кармашек) инструкциями по медицинскому применению.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

4 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения

Российская Федерация

ООО «ДАНСОН-РУ»

142100, Московская область, г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1, стр. 49, пом.1, ком. 220.

Телефон: +7 (495) 580-30-60

Производитель/Организация, принимающая претензии от потребителей

Закрытое акционерное общество «Ярославская фармацевтическая фабрика» (ЗАО «ЯФФ»)

Россия, 150030 г. Ярославль, ул. 1-я Путевая, д. 5.

Тел.: (4852) 44-38-56.

Электронная почта: farmfab@yaroslavl.ru