МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Фурацилин-Алиум

Регистрационный номер

Торговое наименование

Фурацилин-Алиум

Международное непатентованное или группировочное наименование

Нитрофурал

Лекарственная форма

Раствор для местного и наружного применения

Состав

на 100 мл:

Действующее вещество: нитрофурал (фурацилин) – 20 мг.

Вспомогательные вещества: натрия хлорид, вода для инъекций.

Описание:

Прозрачная жидкость желтого цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Противомикробное средство – нитрофуран.

Код АТХ

D08AF01

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Противомикробное средство, производное нитрофурана. Бактериальные флавопротеины, восстанавливая 5-нитрогруппу, образуют высокореактивные аминопроизводные, способные вызвать конформационные изменения белков (в т.ч. рибосомальных) и др. макромолекул, приводя к гибели бактерий.

МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП-005393-011113
СОГЛАСОВАНО
117649

Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (*Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Escherichia coli, Clostridium perfringens*).

Устойчивость развивается медленно и не достигает высокой степени.

Фармакокинетика

При наружном применении всасывание незначительное. Проникает через гистогематические барьеры и равномерно распределяется в жидкостях и тканях. Основной путь метаболизма – восстановление нитрогруппы. Выводится почками и частично с желчью.

Показания к применению

Наружно: гнойные раны, пролежни, ожоги II-III степени, мелкие повреждения кожи (в т. ч. ссадины, царапины, трещины, порезы).

Местно: блефарит, конъюнктивит, остеомиелит, эмпиема придаточных пазух носа и плевры, инфекции мочевыводящих путей – промывание полостей, острый тонзиллит, стоматит, гингивит.

В случае необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к нитрофуралу, производным нитрофурана и/или другим компонентам препарата, кровотечение, аллергодерматозы, выраженные нарушения функции почек.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение при беременности и в период грудного вскармливания возможно, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка. Перед применением препарата, если Вы беременны, или предполагаете, что Вы могли бы быть беременной, или планируете беременность, в период грудного вскармливания необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы

Наружно. Орошают гнойные раны, пролежни, ожоги II-III степени, мелкие повреждения

МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП-005393 011119
СОГЛАСОВАНО
117649

кожи (в т. ч. ссадины, царапины трещины, порезы) и накладывают влажные повязки.

Местно. Внутриполостно: при гайморите – промывают гайморову полость; при остеомиелите после операции – промывают полость с последующим наложением влажной повязки; при эмпиеме плевры – после удаления гноя проводят промывание плевральной полости и вводят 20-100 мл водного раствора; для промывания мочеиспускательного канала и мочевого пузыря применяют водный раствор с экспозицией 20 мин.

Блефарит, конъюнктивит – инстилляция водного раствора в конъюнктивальный мешок.

Острый тонзиллит, стоматит, гингивит – полоскание рта и горла теплым раствором по 100 мл 2-3 раза в день.

Продолжительность курса лечения по показаниям в зависимости от характера и локализации пораженного участка.

Если после лечения улучшение не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат согласно показаниям, тому способу применения, которые указаны в инструкции по применению.

Побочное действие

Аллергические реакции, дерматит.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или отмечаются любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, следует немедленно сообщить об этом врачу.

Передозировка

О случаях передозировки не сообщалось.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не изучалось.

Особые указания

Применение препарата пациентами при тяжелых ожогах на больших поверхностях: при нарушении функции почек возможно прогрессирование почечной недостаточности (уремия, нарушение водно-электролитного баланса, метаболический ацидоз).

МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП-005393-011119
СОГЛАСОВАНО

117649

Влияние лекарственного препарата на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и механизмами, на способность заниматься потенциально опасными видами деятельности, требующими быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Раствор для местного и наружного применения, 0,02%.

По 100 мл, 200 мл, 250 мл, 400 мл, 500 мл в пластиковые флаконы с запаянной горловиной из полиэтилена низкой плотности без колпачка/крышки или с защитным колпачком/крышкой из полиэтилена или полипропилена, со шкалой объемов на боковой поверхности или без нее, с кольцом держателем на дне пластикового флакона или без него. На каждый флакон наклеивают этикетку.

По 1 флакону помещают в индивидуальную картонную пачку вместе с инструкцией по применению.

или

От 1 до 100 флаконов помещают в ящики из гофрированного картона вместе с равным количеством инструкций по применению (для стационаров).

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

1 год.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель/организация, принимающая претензии потребителей

ООО «Производственная фармацевтическая компания «Алиум», Россия, 143442,

МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП-006393-011119
СОГЛАСОВАНО

117649

Московская обл., Красногорский район, село Ангелово, Завод по производству инфузионных растворов и кровезаменителей.

Тел.: (495) 646-28-68, (499) 429-01-93. Эл. почта: info@aliumpharm.ru

Директор по регуляторике и исследованиям **Г.У. Сетдекова**

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ * МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ * ГОРОДА КРАСНОГОРСК * Общество с ограниченной ответственностью * ОГРН 1085024007011 *
«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
«АЛИУМ»
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

МЗ РФ
ФГБУ НЦЭСМП
ЭКСПЕРТНЫЙ ОТЧЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДЛЯ ДАННОЙ ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4

МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП-005303-011119
СОГЛАСОВАНО

117649