

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Облепиховое масло

Регистрационный номер

Торговое наименование

Облепиховое масло

Международное непатентованное или группировочное наименование

Облепихи крушиновидной плодов масло

Лекарственная форма

Суппозитории ректальные

Состав на один суппозиторий:

Активный компонент: облепихового масла концентрат (с содержанием суммы каротиноидов в пересчете на β -каротин не менее 240 мг в 100 г) – 0,5 г.

Вспомогательные вещества: жир твердый (Витепсол марка Н 15, Суппосир марка NA 15) – 0,713 г, жир твердый (Витепсол марка W 35, Суппосир марка NAS 50) – 0,712 г, глицерил моностеарат – 0,075 г (до получения суппозитория массой 2,0 г).

Описание

Суппозитории от оранжевого до темно-оранжевого цвета, торпедообразной формы, с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Ангиопротекторы; средства для лечения геморроя и анальных трещин для местного применения; другие средства для лечения геморроя и анальных трещин для местного применения.

Код АТХ: C05AX

Фармакологическое действие

Облепиховое масло стимулирует репаративные процессы в коже и слизистых оболочках, ускоряет заживление поврежденных тканей, оказывает противовоспалительное действие. Обладает антиоксидантным и цитопротекторным действием (благодаря наличию жирорастворимых биоантиоксидантов уменьшает интенсивность свободнорадикальных процессов и защищает от повреждения клеточные и субклеточные мембраны).

Показания к применению

Геморрой, анальные трещины, эрозивно-язвенные поражения прямой кишки (в том числе, эрозивно-язвенный сфинктерит и проктит), катаральный и атрофический проктит, лучевое поражение слизистой оболочки нижних отделов толстой кишки.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, диарея, детский возраст до 14 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы

Ректально. После опорожнения кишечника суппозиторий вводят глубоко в задний проход. Взрослым и подросткам старше 14 лет назначают по 1 суппозиторию 2 раза в день. Продолжительность курса лечения составляет 10-15 дней. При необходимости, по согласованию с врачом, через 4-6 недель курс лечения повторяют.

Побочное действие

Редко возможны аллергические реакции, ощущение жжения в анальной области, диарея.

Передозировка

До настоящего времени случаи передозировки не зарегистрированы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не описано.

Особые указания

Перед применением препарата следует проконсультироваться с врачом. Во избежание передозировки рекомендуется соблюдать режим дозирования препарата. Если при применении препарата симптомы сохраняются без улучшения более 1 недели или ухудшаются, следует обратиться к врачу.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

Форма выпуска

Суппозитории ректальные.

По 5 суппозитория в контурной ячейковой упаковке из двухслойной пленки или из пленки из полимерных материалов из поливинилхлорида и полиэтилена высокого давления или пленки ПВХ/ПЭ белой комбинированной или из пленки поливинилхлоридной.

2 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по медицинскому применению препарата помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 15 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения

Акционерное общество «ЭРКАФАРМ» (АО «ЭРКАФАРМ»), Россия

105005, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Бакунинская, д. 14,

стр. 1, этаж 3, помещ. I, комната 5А

Производитель/Организация, принимающая претензии потребителей:

ООО «Тульская фармацевтическая фабрика»

Россия, 300004, г. Тула, Торховский проезд, д. 10

Тел./факс: (4872) 41-04-73.