

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ

ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ОБЛЕПИХОВОЕ МАСЛО ИЗ ПЛОДОВ И ЛИСТЬЕВ

Регистрационный номер: Р N001309/01 от 08.04.2009.

Торговое наименование: Облепиховое масло из плодов и листьев.

Международное непатентованное или группировочное наименование: Облепихи масло.

Лекарственная форма: Масло для приема внутрь, местного и наружного применения.

Состав:

Отжатые, сухие плоды и листья облепихи крушиновидной - 150 г, подсолнечное масло- достаточное количество для получения 100 мл масла.

Облепиховое масло содержит смесь каротина и каротиноидов (не менее 130 мг%), суммы токоферолов (не менее 110 мг%), хлорофилловые соединения (не более 100 мг%), глицериды олеиновой, линолевой, пальмитиновой и стеариновой кислот.

Описание:

Маслянистая жидкость оранжево-коричневого цвета с характерным запахом. Допускается незначительный осадок, растворяющийся при нагревании до 40°C.

Фармакотерапевтическая группа: Репарации тканей стимулятор растительного происхождения.

Код АТХ: D11A

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика:


Стимулирует репаративные процессы при поражениях кожи и слизистых оболочек различной этиологии (раневых, лучевых, ожоговых, язвенных). Фармакологическое действие обусловлено наличием в облепиховом масле каротина (провитамина А), токоферолов (витамина Е) и других липофильных веществ.

Фармакокинетика:

Данные отсутствуют.

Показания к применению:

- Наружно в качестве ранозаживляющего средства в комплексной терапии при



поражениях кожи и слизистых оболочек;

- Внутрь при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки;
- Местно применяют при кольпите, эндоцервиците, эрозии шейки матки, при раневых, лучевые повреждениях кожи, при ожогах.

Противопоказания:

Повышенная индивидуальная чувствительность к препарату. Для приёма внутрь – холецистит, холангит, панкреатит, гепатит, холелитиаз, детский возраст до 12 лет. При наружном и местном применении – профузное кровотечение, обильное гнойное отделяемое из раны.

С осторожностью:

При приёме внутрь – беременность, детский возраст старше 12 лет.

Если у Вас есть одно из перечисленных выше заболеваний, перед применением препарата необходимо проконсультироваться с врачом.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания:

Применение при беременности и в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая польза для женщины превышает потенциальный риск для плода или ребёнка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы:

Наружно, внутрь; местно по назначению врача.

Наружно: при поражениях кожи применяют в виде масляных повязок. На предварительно очищенный от некротических тканей участок кожи наносят облепиховое масло, а затем ватно-марлевую повязку, которую меняют через день. Лечение проводят до появления грануляции. При тимпанопластике, тампонами, обильно пропитанными облепиховым маслом, тампонируют раневую поверхность после обработки антибиотиками или гидрокортизоном. Курс лечения 7-10 процедур. Внутрь: при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки принимают внутрь по 1 чайной ложке 2-3 раза в день в течение 3-4 недель.

Местно: при лечении кольпита, эндоцервицита, эрозии шейки матки применяют в виде тампонов, обильно пропитанных облепиховым маслом. Курс лечения при кольпите 10-15 процедур; эндоцервиците, эрозии шейки матки 8-12 процедур.

Если после лечения улучшение не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Нарушение со стороны кожи и подкожных тканей: жжение (при местном и наружном применении).

Нарушение со стороны желудочно-кишечного тракта при приёме внутрь: ощущение горечи во рту, диарея.

Нарушение со стороны печени и желчевыводящих путей: желчная колика.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка:

До настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано.

При передозировке препарата необходимо обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не описано.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами:

Препарат не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе, управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Особые указания:

Лечение проводится под наблюдением врача.

Не превышать максимальные сроки и рекомендованные дозы при самостоятельном применении препарата.

Форма выпуска:

Масло для приема внутрь, местного и наружного применения. Флаконы темного стекла 50 мл или 100 мл; отдельный флакон вместе с инструкцией по применению помещён в пачку из картона.

Условия хранения:

В защищенном от света месте, при температуре не выше 10°C. Хранить в

недоступном для детей месте.

Срок годности:

2 года.

Не применять препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска:

Отпускают без рецепта.

Перед употреблением взбалтывать.

Производитель/Организация, принимающая претензии потребителей:

ООО «Катунь-Олеум», Россия, 659540, Алтайский край, Советский район,
с. Советское, ул. Животовых, 2т.

Тел./Факс: (38598) 22-8-90

Директор ООО «Катунь-Олеум»



К.А. Агеев