МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП-013643/01- 27 0813
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Тазепам
наименование лекарственного препарата

таблетки покрытые пленочной оболочкой, 10 мг
лекарственная форма, дозировка

Тархоминский фармацевтический завод
«Польфа» Акционерное Общество, Польша
наименование производителя, страна

Изменение № 2

Дата внесения Изменения «____» 27 0813 20___г.

Старая редакция	Новая редакция
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ***Фармакодинамика*** Оксазепам относится к группе производных 1,4-бензодиазепина. Препарат действует на многие структуры центральной нервной системы - прежде всего на лимбическую систему и гипоталамус, т.е. на структуры связанные с регуляцией эмоциональной деятельности. Как и все другие бензодиазепины, он усиливает тормозное влияние ГАМК-ергических нейронов коры головного мозга, гипокампа, мозжечка, таламуса и гипоталамуса. Выявлено существование специфических для бензодиазепинов участков связывания, представляющих собой белковые структуры клеточной мембраны имеющих связь с комплексом, состоящим из рецептора ГАМК-А и хлорного канала. Механизм	**ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА** ***Фармакодинамика*** Препарат относится к списку психотропных веществ (список III). Оксазепам относится к группе производных 1,4-бензодиазепина. Препарат действует на многие структуры центральной нервной системы - прежде всего на лимбическую систему и гипоталамус, т.е. на структуры связанные с регуляцией эмоциональной деятельности. Как и все другие бензодиазепины, он усиливает тормозное влияние ГАМК-ергических нейронов коры головного мозга, гипокампа, мозжечка, таламуса и гипоталамуса. Выявлено существование специфических для бензодиазепинов участков связывания, представляющих собой белковые структуры клеточной мембраны имеющих связь с комплексом,

Старая редакция	Новая редакция
действия оксазепама связан с модуляцией чувствительности ГАМК-ергического рецептора, приводящей к увеличению сродства рецептора к гамма-аминомасляной кислоте (ГАМК), которая является тормозным эндогенным нейромедиатором. Следствием активации бензодиазепинового рецептора или ГАМК-А является увеличение транспорта ионов хлора внутрь нейрона через хлорный канал, что приводит к гиперполяризации клеточной мембраны, а в итоге к угнетению активности нейронов. Оксазепам обладает анксиолитическим, седативным и снотворным действием. Оказывает слабое расслабляющее действие на скелетную мускулатуру.	состоящим из рецептора ГАМК-А и хлорного канала Механизм действия оксазепама связан с модуляцией чувствительности ГАМК-ергического рецептора, приводящей к увеличению сродства рецептора к гамма-аминомасляной кислоте (ГАМК), которая является тормозным эндогенным нейромедиатором. Следствием активации бензодиазепинового рецептора или ГАМК-А является увеличение транспорта ионов хлора внутрь нейрона через хлорный канал, что приводит к гиперполяризации клеточной мембраны, а в итоге к угнетению активности нейронов. Оксазепам обладает анксиолитическим, седативным и снотворным действием. Оказывает слабое расслабляющее действие на скелетную мускулатуру.
ФОРМА ВЫПУСКА Таблетки покрытые пленочной оболочкой, 10 мг. По 25 таблеток покрытых пленочной оболочкой в блистер их поливинилхлоридной пленки и алюминиевой фольги. По два блистера вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.	**ФОРМА ВЫПУСКА** Таблетки покрытые пленочной оболочкой, 10 мг. По 25 таблеток покрытых пленочной оболочкой в блистер их поливинилхлоридной пленки и алюминиевой фольги. По два блистера вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку, снабженную стикерами контроля первого вскрытия.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С. Хранить в местах, недоступных для детей.	**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ** Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С. Хранить в местах, недоступных для детей.

Старая редакция	Новая редакция
	Препарат относится к списку психотропных веществ (список III).

Генеральный директор ООО «Фармэксперт» Стенин В.М.